WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/81, 15/00, C12Q 1/68, C12N 1/19, C12Q 1/18

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/44135

A2

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

8. Oktober 1998 (08.10.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/01904

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. April 1998 (02.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 13 572.2

2. April 1997 (02.04.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Brüningstrasse 50, D-65929 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HINNEN, Albert [DE/DE]; Scheidlerstrasse 17, D-07745 Jena (DE). HEGEMANN, Johannes [DE/DE]; In den Gärten 33, D-35398 Giessen (DE). MUNDER, Thomas [DE/DE]; Engelplatz 3, D-07743 Jena (DE). SCHUSTER, Tilmer [DE/DE]; Eichenweg 40, D-97440 Werneck (DE). FELDMANN, Horst [DE/DE]; Pasinger Heuweg 86, D-80999 München (DE). KRAMER, Wilfried [DE/DE]; Strasse an der St. Vinzenz Kirche 10, D-37077 Göttingen (DE). ZIMMERMANN, Priedrich, Karl [DE/DE]; Goethestrasse 12, D-64372 Ober-Ramstadt (DE). ENTIAN, Karl-Dieter [DE/DE]; Oberurseler Strasse 43, D-61440 Oberursel (DE). ROSE, Matthias [DE/DE]; Theodor-Heuss-Strasse 4, D-61267 Neu-Anspach (DE).

KÖTTER, Peter [DE/DE]; Industriestrasse 3A, D-61440 Oberursel (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

- (54) Title: METHOD FOR SCREENING ANTIMYCOTICALLY ACTIVE SUBSTANCES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM SCREENING VON ANTIMYKOTISCH WIRKENDEN SUBSTANZEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for screening antimycotically active substances, whereby essential genes from mycetes, especially of Saccaromyces cerevisae, and functionally homologous and/or sequentially homologous mycetes genes are used as targets. Said method is thus characterized in that essential genes from mycetes are used as targets.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Screening von antimykotisch wirksamen Substanzen, wobei essentielle Gene aus Myceten, insbesondere von Saccaronyces cerevisae sowie funktionshomologe und/oder sequenzhomologe Mycetengene als Targets eingesetzt werden. Verfahren zum Auffinden von antimykotisch wirkenden Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß essentielle Gene aus Myceten als Targets eingesetzt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL AM AT	Albanien Armenien Österreich Australien	ES FT FR GA GB	Spanien Finaland Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich	LS LT LU LV MC	Lesotho Litauen Luxemburg Lettland Monaco	SI SK SN SZ TD	Slowenien Slowakei Senegal Swasiland Tschad
AZ BA BBB BBF BBG BJ BR CCF CG CCH CCI CCM CCI DE CCE DE EE	Aserbaidschan Bonnien-Herzegowina Barbados Belgien Burkina Faso Bulgarien Benin Benin Berasilien Belarus Kanada Zentralafrikmische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kanerun China Kuba Tschechische Republik Deutschland Dänemark Estland	GB GB GH GN GR HU IE IL IS IT JP K8 KG KP LC LC LL LK LR	Georgien Ghana Guinea Griechenland Ungam Irland Israel Island Italien Japan Kenia Kingisistan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Kasachstan St. Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia	MD MG MK ML MN MR MW MX NE NL NO NZ PI PT RO RU SB SG	Republik Moldau Madagaskar Die chemalige jugoslawische Republik Mazedonien Mali Mengolei Mauretanien Malawi Mer iko Niger Niederlande Norwegen Neuseeland Polen Portugal Rum änien Russische Pöderation Siden Schweden Singapur	TG TJ TM TR TT UA UG US UZ YN YU ZW	Togo Tadschikistan Turkmenistan Turkei Trinidad und Tobago Ukraine Uganda Verefnigte Staaten von Amerika Usbekistan Vicunam Jugoslawien Zimbabwe

Verfahren zum Screening von antimykotisch wirkenden Substanzen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Screening von antimykotisch wirksamen Substanzen, wobei essentielle Gene aus Myceten, insbesondere von Saccharomyces cerevisiae sowie funktionshomologe und/oder sequenzhomologe Mycetengene als Targets eingesetzt werden.

Das Spektrum der bekannten Pilzinfektionen reicht von Pilzbefällen an der Hautoberfläche oder der Nägel bis hin zu potentiell lebenbedrohlichen mykotischen Infektionen der inneren Organe. Derartige Infektionen und damit einhergehende Folgeerkrankungen, werden als Mykosen bezeichnet.

Zur Behandlung von Mykosen werden antimykotisch (fungistatisch oder fungizid) wirkende Substanzen eingesetzt. Bisher gibt es aber nur relativ wenige pharmakologisch wirksame Substanzen, wie beispielsweise Amphotericin B, Nystatin, Pimaricin, Griseofulvin, Clotrimazol, 5-Fluorcytosin und Batraphen. Die medikamentiöse Behandlung von Pilzinfektionen ist außerordentlich schwierig, insbesondere deshalb, weil es sich sowohl bei den Myceten als auch bei den Wirtszellen um eukaryotische Zellen handelt. Die Einnahme von Arzneimitteln, die die bekannten antimykotischen Wirkstoffe enthalten ist deshalb oft mit unerwünschten Nebenwirkungen verbunden, beispielsweise wirkt Amphotericin B nephrotoxisch. Es besteht also ein starker Bedarf an pharmakologisch wirksamen Substanzen, die zur Herstellung von Medikamenten eingesetzt werden können, die bei einer Schwächung des Immunsystems prophylaktisch oder im Falle einer bereits vorliegenden Infektion zur Behandlung von Mykosen eingesetzt werden können. Dabei sollten die Substanzen ein spezifisches Wirkprofil aufweisen, so daß selektiv das Wachstum und die Vermehrung von Myceten verhindert werden kann, ohne dabei den Wirtsorganismus zu schädigen.

Für die Identifizierung antimykotisch wirksamer Substanzen fehlt es bisher an kompatiblen, aussagekräftigen Testverfahren.

In WO 95/11969 wird ein Verfahren zum Screening von antimykotischen Substanzen beschrieben, wobei der Effekt von zu testenden Substanzen auf die Translation eines Proteins als Maß für die Wirkung der zu testenden Substanz bestimmt wird.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Identifizierung von antimykotisch wirkenden Substanzen zu entwickeln, welches möglichst universell einsetzbar ist und die Testung einer Vielzahl von potentiellen Wirkstoffen in einer möglichst effektiven Weise ermöglicht.

Ein wesentliches Merkmal des Verfahrens ist, daß essentielle Gene aus Myceten als Targets für das Screening verwendet werden. Dieses Verfahren unterscheidet sich insbeondere dadurch von bekannten Verfahren, daß keine detaillierten Kenntnisse über die biochemische Funktion des durch das essentielle Gen kodierten Proteins notwendig sind.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auffinden von antimykotisch wirkenden Substanzen, wobei essentielle Gene aus Myceten und/oder die Genprodukte dieser essentiellen Gene als Targets eingesetzt werden. Insbesondere werden antimykotisch wirkende Substanzen dadurch aufgefunden, daß sie die funktionelle Expression der essentiellen Gene (Transkription und Translation) aus Myceten oder die funktionelle Aktivität der kodierten Proteine ganz oder teilweise inhibieren.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auffinden von antimykotisch wirkenden Substanzen, wobei in dem Verfahren

- a) eine Nukleinsäure, die die Expression eines essentiellen Proteins aus Saccharomyces cerevisiae kontrolliert und/oder die für ein essentielles Protein aus Saccharomyces cerevisiae oder einen Teil desselben kodiert oder das kodierte essentielle Protein selbst oder
- b) eine andere Nukleinsäure, die die Expression eines zu dem unter a) genannten Proteins funktionsähnlichen Proteins aus einer anderen Mycetenspezies kontrolliert und/oder die für ein zu dem unter a) genannten Protein funktionsähnliches Protein aus einer anderen Mycetenspezies kodiert oder das kodierte funktionsähnliche

3

Protein selbst als Target eingesetzt wird, wobei dann entweder

- a) der Effekt einer zu untersuchenden Substanz auf die Expression des essentiellen Proteins aus Saccharomyces cerevisiae oder die funktionelle Aktivität des kodierten essentiellen Proteins selbst oder
- b) der Effekt einer zu untersuchenden Substanz auf die Expression des funktionsähnlichen Proteins aus einer anderen Mycetenspezies oder die funktionelle Aktivität des kodierten funktionsähnlichen Proteins selbst bestimmt wird.

In einer Ausführungsform des Verfahrens ist die Nukleinsäure ein essentielles Gen oder ein Teil desselben, beispielsweise der Promotor des essentiellen Gens oder ein Enhancer des essentiellen Gens.

Die Erfindung beinhaltet, daß essentielle Gene in Myceten identifiziert werden, die dann in dem Screeningverfahren eingesetzt werden können.

Die Erfindung beinhaltet, daß zuerst essentielle Gene in Saccharomyces cerevisiae identifiziert werden. Die Erfindung beinhaltet auch, daß ausgehend von identifizierten essentiellen Genen in Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) funktionsähnliche Gene in anderen Myceten identifiziert werden. Diese funktionsähnlichen Genen können gegebenfalls essentielle Gene in anderen Myceten sein.

Um essentielle Gene in S. cerevisiae zu identifizieren, werden einzelne Gene von S. cerevisiae durch homologe Rekombination aus dem Genom der S. cerevisiae entfernt. Handelt es sich bei dem entfernten DNA-Abschnitt um ein essentielles Gen, dann ist die Deletion letal für die S. cerevisiae Zellen.

Um entsprechende Deletionen im Genom von S. cerevisiae zu erzeugen und solche S. cerevisiae Zellen, die die Deletion tragen selektionieren zu können, wird eine Methode verwendet, bei dem das zu untersuchende S. cerevisiae Gen durch ein Markergen ersetzt wird. Über dieses Markergen (Gen eines Selektionsmarkers) können die Zellen selektioniert werden, bei denen eine homologe Rekombination stattgefunden hat, da bei ihnen das zu untersuchende Gen durch das Gen eines

4

Selektionsmarkers ersetzt worden ist. Als Selektionsmarker können z. B. dominante Selektionsmarker oder Auxotrophiemarker verwendet werden.

Als Auxotrophiemarker werden Gene benutzt, die für Schlüsselenzyme der Aminosäure- oder Nukleobasen-Synthesewege kodieren. Beispielsweise können S. cerevisiae Gene die für Enzyme aus dem Aminosäurestoffwechsel von Leucin (z. B. LEU2-Gen), Histidin (z. B. HIS3-Gen) oder Tryptophan (z. B. TRP1-Gen) oder aus dem der Stoffwechsel der Nukleobase Uracil (z. B. URA3-Gen) kodieren, als Marker verwendet werden.

Das Verfahren beinhaltet, daß auxotrophe S. cerevisiae Zellen bzw. Stämme verwendet werden können, d. h. Zellen bzw. Stämme, in denen das für den jeweils verwendeten Marker kodierende Gen ein oder mehrere Mutationen aufweist, wodurch gewährleistet wird, daß kein funktionell aktives Enzym exprimiert wird. Diese auxotrophen Zellen bzw. Stämme können nur in Nährmedien wachsen, in denen die entsprechenden Aminosäuren oder Nukleobasen enthalten sind. Als Stämme können beispielsweise alle S. cerevisiae Laborstämme verwendet werden, die Auxotrophie- und/oder Nukleobasen-Marker besitzen. Werden diploide S. cerevisiae Zellen bzw. Stämme eingesetzt dann, müssen die entsprechenden Markergene homozygot mutiert vorliegen. Insbesondere wird der Stamm CEN.PK2 (Scientific Research & Development GmbH, Oberursel, Deutschland) oder isogene Derivate dieses Stamms eingesetzt.

Das Verfahren beinhaltet auch, daß S. cerevisiae Zellen bzw. Stämme verwendet werden, die keine geeigneten Auxotrophiemarker besitzen beispielsweise prototrophe S. cerevisiae Zellen bzw. Stämme. Dann können dominante Selektionsmarker, beispielsweise Resistenzgene, wie das Kanamycin-Resistenzgen als Marker eingesetzt werden.

Für die homologe Rekombination, bei der in Genen von S. cerevisiae die DNA-Sequenz des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens ganz oder teilweise durch die Sequenz des Markergens ersetzt wird, werden DNA-Fragmente eingesetzt, bei denen das Markergen am 5'- und am 3'-Ende von Sequenzen flankiert wird, die zu

Sequenz-Abschnitten am 5'- und 3'-Ende des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens homolog sind.

Für die Herstellung entsprechender DNA-Fragmente sind verschiedene Verfahren möglich, die zur Deletion spezifischer S. cerevisiae Gene etwa gleich gut geeignet sind. Für die Transformation in eine geeignete S. cerevisiae Zelle bzw. einen Stamm wird ein lineares DNA-Fragment eingesetzt. Dieses wird durch die homologe Rekombination ins S. cerevisiae Genom integriert.

In dem Verfahren können drei verschiedene Methoden verwendet werden:

- "Klassische Methode" zur Erzeugung von Deletionskassetten (Rothstein, R. J. (1983) Methods in Enzymology Vol. 101, 202 - 211).
- 2. "Klassische Methode" unter Verwendung der PCR-Technik ("Modifizierte Klassische Methode").
- 3. SFH (short flanking homology)-PCR-Methode (Wach, A. et al. (1994) Yeast 10: 1793 1808; Güldner, U. et al. (1996) Nucleic Acids Research 24: 2519 2524).
- 1. Bei der "Klassischen Methode" zur Erzeugung von Deletionskassetten im S. cerevisiae Genom liegt das zu untersuchende Gen entweder bereits in einem geeigneten Vektor vor oder es wird in einen solchen integriert. Bei dieser Methode können beispielsweise alle pBR-, pUC- und pBluescript®-Derivate verwendet werden. Aus diesen Vektoren wird, z. B. unter Verwendung geschickt ausgewählter Restriktionsschnittstellen, ein Großteil der Sequenz des zu untersuchenden Gens entfernt, wobei aber die 5′- und 3′-Bereiche des zu untersuchenden Gens im Vektor verbleiben. Zwischen diese verbleibenden Bereiche wird das Gen des ausgewählten Selektionsmarkers integriert.
- Bei einer modifizierten Form dieser 'Klassischen Methode' wird die PCR-Technik eingesetzt. Bei dieser Methode werden die Bereiche des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens, die sich am 3'- beziehungsweise 5'-Ende der

ļ

kodierenden Sequenz befinden mit Hilfe der PCR-Technik amplifiziert. Bei diesem Verfahren werden ausschließlich die Randbereiche beidseitig des zu untersuchenden Gens amplifiziert, weshalb für jedes zu untersuchende Gen zwei PCR-Reaktionen durchgeführt werden müssen, wobei einmal das 5'- und einmal das 3'-Ende des Gens amplifiziert wird. Die Länge der amplifizierten DNA-Abschnitte der Randbereiche hängt beispielsweise von den in diesen Bereichen vorhandenen Restriktionsschnittstellen ab. Die amplifizierten Randbereiche des zu untersuchenden Gens haben in der Regel eine Länge von 50 bis 5000 Basenpaaren, besonders bevorzugt eine Länge zwischen 500 und 1000 Basenpaaren (Bp).

Als Template für die PCR-Reaktion kann beispielsweise genomische DNA aus S. cerevisiae eingesetzt werden. Als Template für die PCR-Reaktionen können Wildtyp-Gene oder modifizierte Wildtyp-Gene verwendet werden. Die Primer-Paare (jeweils ein Sense- und ein Antisense-Primer) werden so konstruiert, daß sie Sequenz-Abschnitten am 3'- bzw. 5'-Ende des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens entsprechen. Insbesondere werden die Primer so gewählt, daß eine Integration über geeignete Restriktionsschnittstellen in den Vektor möglich ist.

Als Vektoren können Derivate des pUC-, pBR- und pBluescript®-Vektors eingesetzt werden. Insbesondere sind Vektoren geeignet, die bereits ein Gen, das für einen Selektionsmarker kodiert, enthalten. Insbesondere können hierzu Vektoren verwendet werden, die die Gene der Selektionsmarker HIS3, LEU2, TRP1 oder URA3 enthalten. Beispielsweise können hierzu die Plasmide pPK5/6 (SEQ ID NO. 18), pPK7/8 (SEQ ID NO. 19), pPK9/10 (SEQ ID. NO. 20) und pPK13/14 (SEQ ID NO. 21) verwendet werden. Die Nukleotidsequenz der Plasmide pPK5/6, pPK7/8, pPK9/10 und pPK13/14 ist im Sequenzprotokoll angegeben. Die Herstellung dieser Plasmide ist in den Beispielen 2 bis 6 beschrieben.

Die mittels PCR erzeugten DNA-Abschnitte des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens werden beiderseits des im Vektor bereits vorhandenen Gens, das für den Selektionsmarker kodiert, in den Vektor integriert, so daß anschließend, wie bei der "Klassischen Methode", der verwendete Selektionsmarker beidseitig von homologen

7

DNA-Sequenzen des zu untersuchenden Gens flankiert vorliegt.

3. Da überraschenderweise die homolge Rekombination an S. cerevisiae sehr effizient und präzise verläuft, kann die Länge der zu dem zu untersuchenden S. cerevisiae Gen homologen DNA-Abschnitte, die das Gen des Selektionsmarkers flankieren, gegebenenfalls deutlich kürzer gewählt werden als bei der "Modifizierten Klassischen Methode". Die flankierenden, zu dem zu untersuchenden Gen homologen Bereiche brauchen nur eine Länge von etwa 20 - 60 Basenpaaren, besonders bevorzugt von 30 - 45 Basenpaaren, aufzuweisen. Besonders vorteilhaft an der SFH-PCR-Methode ist, daß aufwendige Klonierungsschritte entfallen.

An einem DNA-Template, daß das Gen für den zu verwendenden Selektionsmarker enthält, wird eine PCR-Reaktion durchgeführt, wobei die verwendeten Primer so konstruiert werden, daß die DNA-Sequenz des Sense-Primers dem 5'- Ende der Sequenz des Selektionsmarkers homolog ist und daß der Primer zusätzlich an seinem 5'-Ende einen vorzugsweise 40 Nukleotide langen Bereich aufweist, der der Sequenz am 5'-Ende des zu untersuchenden S. cerevisiae Gens entspricht. Analog wird der Antisense-Primer so konstruiert, daß er zu dem 3'-Ende der Sequenz des Gens des Selektionsmarkers komplementär ist, wobei dieser Primer an seinem 5'-Ende einen vorzugsweise ebenfalls 40 Nukleotide langen Bereich enthält, der der Sequenz am 3'-Ende des zu untersuchenden Gens entspricht.

Für die Amplifikation von zu untersuchenden S. cerevisiae Genen mit Hilfe der SFH-PCR-Methode werden beispielsweise Vektoren verwendet, die bereits das Gen für einen Auxotrophie- oder einen Selektionsmarker enthalten. Insbesondere wird das Plasmid pUG6 als Template verwendet. Dieses Plasmid enthält eine loxP-KanMX-loxP Kassette (Güldener, U. et al. (1996) Nucleic Acids Research 24: 2519 - 2524). Das heißt, ein Kanamycin-Resistenzgen ist beidseitig von einer loxP-Sequenz (loxP-KanMX-loxP Kassette) flankiert. Die Verwendung dieser Kassette hat den Vorteil. daß nach der Integration der loxP-KanMX-loxP Kassette an den Genort an dem das zu untersuchende S. cerevisiae Gen lokalisiert war, das Kanamycin-Resistenzgen gegebenenfalls wieder aus dem S. cerevisiae Genom entfernt werden kann. Dafür kann die Cre-Rekombinase des Bakteriophagen P1 verwendet werden.

Die Cre-Rekombinase erkennt die loxP-Sequenzen und entfernt die zwischen den beiden loxP-Sequenzen liegende DNA durch einen homologen Rekombinationsprozeß. Als Ergebnis bleibt nur eine loxP-Sequenz zurück und es kommt zur sogenannten Marker-Rückgewinnung, d. h. der S. cerevisiae Stamm kann erneut mit loxP-KanMX-loxP Kassette transformiert werden. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn zwei oder mehrere funktionshomologe Gene deletieren werden sollen, um einen letalen Phänotyp zu erhalten.

Bei der SFH-PCR-Methode werden in der PCR-Reaktion Primer verwendet, die an ihrem 3'-Ende einen vorzugsweise etwa 20 Nukleotide langen Bereich aufweisen, der zu Sequenzen links beziehungsweise rechts von der loxP-KanMX-loxP Kassette homolog ist, wobei die Primer jeweils an ihrem 5'-Ende einen vorzugsweise 40 Nukleotide langen Bereich aufweisen, der Sequenzabschnitten an den Enden des zu untersuchenden Gens homolog ist.

Mit allen drei Methoden werden lineare Deletionskassetten erhalten, die das Gen für einen ausgewählten Selektionsmarker enthalten, der beidseitig von homologen Sequenzen des zu untersuchenden Gens flankiert wird. Diese Deletionskassetten werden für die Transformation diploider S. cerevisiae Stämme eingesetzt. Beispielsweise kann hierfür der diploide S. cerevisiae Stamm CEN.PK2 (Scientific Research & Development GmbH, Oberursel, Deutschland) verwendet werden.

CEN.PK2 Mata/MAT α ura3-52/ura3-52 leu2-3, 112/leu2-3, 112 his3Δ1/his3Δ1 trp1-289/trp1-289 MAL2-8°/MAL2-8° SUC2/SUC2

Der Stamm CEN.PK2 wird nach bekannten Verfahren angezogen und kultiviert (Gietz, R. D. et al. (1992) Nucleic Acids Research 8: 1425; Güldener, U. et al. (1996) Nucleic Acids Research 24: 2519 - 2524).

Die Zellen des verwendeten S. cerevisiae Stammes werden mit einer entsprechenden Menge DNA der linearen Deletionskassette nach bekannten Verfahren transformiert (beispielsweise Sambrook et al. (1989) Molecular Cloning, A Laboratory Manual. Cold Spring Habor Laboratory Press). Danach wird das Medium

9

in dem die Zellen kultiviert werden gegen neues Medium, sogenanntes Selektivmedium, das die entsprechende Aminosäure (beispielsweise Histidin, Leucin oder Tryptophan) oder Nukleobase (beispielsweise Uracil) nicht enthält bzw. bei Verwendung einer Deletionskassette die das Kanamycin-Resistenzgen enthält, in Medien mit Geniticin (G418®) kultiviert. Alternativ können die transformierten Zellen auf mit entsprechendem Medium hergestellten Agarplatten ausplattiert werden. Auf diese Weise werden die Transformanden selektioniert, bei denen eine homologe Rekombination stattgefunden hat, da nur diese Zellen unter den veränderten Bedingungen wachsen können.

In den meisten Fällen wird bei der Transformation einer diploiden S. cerevisiae Zelle bzw. eines Stammes aber nur eine der beiden in dem doppelten Chromosomensatz vorliegenden Kopien des zu untersuchenden Gens durch die DNA der Deletions-Kassette ersetzt, so daß eine heterozygot-diploide S. cerevisiae Zelle bzw. ein heterozygot-diploider S. cerevisiae Mutantenstamm entsteht, bei der/dem eine Kopie des zu untersuchenden Gens durch das Gen des Selektionsmarkers ersetzt wird, während die andere Kopie des zu untersuchenden Gens im Genom erhalten bleibt. Das hat den Vorteil, daß falls auf diese Weise ein essentielles Gen deletiert wird, die heterozygot-diploide Zelle bzw. der S. cerevisiae Mutantenstamm aufgrund der noch vorhandenen zweiten Kopie des essentiellen Gens weiterhin lebensfähig ist.

Die korrekte Integration der DNA der Deletionskassette an den vorbestimmen chromosornalen Geniocus (Geniocus des zu untersuchenden Gens) kann gegebenenfalls mit Hilfe der Southern-Blot-Analyse (Southern, E. M. (1975) J. Mol. Biol. 98: 503 - 517) oder mit Hilfe der diagnostischen PCR-Analyse unter Verwendung spezifischer Primer überprüft werden (Güldener, U. et al. (1996) Nucleic Acids Research 24: 2519 - 2524).

Die genetische Aufspaltung einzelner diploider Zellen läßt sich mit einer Tetradenanalyse verfolgen. Dazu werden diploide Stämme, insbesondere heterozygot-diploide Mutantenstämme, mit Hilfe von bekannten Verfahren zur Reduktionsteilung (Meiose) angeregt, beispielsweise durch Stickstoffverarmung auf

10

Kaliumacetat-Platten (Sherman, F. et al. (1986) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N. Y.; Guthrie, C. und Fink, G. R. (1991) Methods in Enzymology. Volume 194. Academic Press, San Diego, 3 - 21; Ausubel, F. M. et al. (1987) Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, Inc., Chapter 13). Die Meiose resultiert in Asci mit vier Ascosporen (Segreganten), die nach enzymatischen Partialverdauung der Ascussporenwand mit Zymolyase (Ausubel et al. (1987)) mit Hilfe eines Mikromanipulators (z.B. Firma SINGER) vereinzelt werden können. Wird beispielsweise ein heterozygot-diploider Mutantenstamm, bei dem ein essentielles Gen im doppelten Chromosomensatz durch die homologe Rekombination ausgetauscht wurde einer Tetraden-Analyse unterzogen, dann überleben nur zwei Segreganten, nämlich die, die das essentielle Gen noch tragen. Die beiden anderen Segreganten sind nicht lebensfähig, weil bei ihnen das zu untersuchende, in diesem Fall essentielle Gen, fehlt.

Zur Verifikation, ob die auf diese Weise untersuchten Gene tatsächlich essentiell sind oder ob dem Genlocus des zu untersuchenden Gens benachbarte, möglicherweise essentielle Gene durch die homologe Rekombination "beschädigt" wurden, werden die heterozygot-diploiden S. cerevisiae Mutantenstämme mit einem Centromerplasmid, in dem das zu untersuchende Gen vorliegt, transformiert. Die Transformanden werden einer Tetraden-Analyse unterzogen. Werden dann wieder vier anstelle von zwei lebensfähigen Segreganten erhalten, so kann das im Centromerplasmid vorliegende zu untersuchende Gen den Defekt der zwei nicht lebensfähigen haploiden S. cerevisiae Zellen/Mutantenstämme komplementieren, womit bewiesen ist, daß das untersuchte S. cerevisiae Gen essentiell ist.

Vorzugsweise werden als Centromerplasmide Plasmide verwendet, die in niedriger Kopienzahl, beispielsweise in 1 oder 2 Kopien pro Zelle vorliegen. Beispielsweise können hierzu die Plasmide pRS313, pRS314, pRS315 und pRS316 (Sikorski, R. S. und Hieter, P. (1989) Genetics 122: 19 - 27) oder ähnliche Plasmide verwendet werden. Dabei werden die zu untersuchenden Gene vorzugsweise einschließlich ihrer 5'- und 3'-nichtkodierenden Bereiche in diese Plasmide integriert.

Mit den beschriebenen Methoden lassen sich einzelne Gene von Saccharomyces cerivisae, deren DNA-Sequenz ganz oder teilweise bekannt ist, untersuchen. Die komplette DNA-Sequenz des S. cerevisiae Genoms wurde am 24. April 1996 über das World Wide Wep (WWW) veröffentlicht.

Folgende Möglichkeiten bestehen, um auf DNA-Sequenzen des S. cerevisiae Genoms übers WWW zuzugreifen.

MIPS (Munich Information Centre of Protein Sequence)

Adresse http://speedy.mips.biochem.mpg.de/mips/yeast/yeast-genom.htmlx

SGD (Saccharomyces Genome Database, Stanford)

Adresse http://genome-www.stanford.edu/Saccharomyces

YPD (Yeast Protein Database, Cold Spring Harbor)

Adresse: http://www.prteome.com/YPDhome.html

Die vollständige DNA-Sequenz des S. Cerevisiae Genoms ist auch über FTP (file transfer protocol) in Europa (z.B. unter der Adresse: ftp.mips.embnet.org) in den USA (Adresse: genome-ftp.stanford.edu) oder in Japan (Adresse: ftp.nig.ac.jp) zugänglich.

Unter Verwendung der beschriebenen Methoden kann mit Hilfe dieser Sequenzinformation für jedes einzelne Saccharomyces cerevisiae Gen bestimmt werden, ob das jeweilige Gen für S. cerevisiae essentiell ist.

Im Genom von S. cerevisiae wurden auf diese Weise die Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w als essentiell identifiziert.

Tabelle 6 gibt einen Überblick über diese essentiellen Gene und die damit in Zusammenhang stehenden Informationen. In Spalte 1 sind die Bezeichnungen für die erzeugten Mutantenstamm (CEN.PK2 Stämme, in denen das essentielle Gen durch ein Markergen ausgetauscht wurde), in Spalte 2 die systematischen Gen-Namen der essentiellen Gene (Bezeichnung unter der die entsprechenden DNA-Sequenzen in Datenbanken geführt werden), in Spalte 3 die zur Herstellung des Mutantenstämme verwendeten Selektionsmarker sowie in den Spalten 4 und 5 die deletierten Nukleotide und die dazu korrespondierenden Aminosäuren der essentiellen Gene (als Bezugspunkt dient die Position 1; Position 1 ist das A des voraussichtlichen Start-Codons ATG des offenen Leserahmens) angegeben. Soweit verfügbar, sind auch die Gen-Namen (Spalte 6) und Einträge in Datenbanken DB (Spalte 7), angegeben. Insbesondere sind dort Eintragungen aus Datenbanken über die Essentialität der Gene vermerkt. Beispielsweise bei dem Gen YGR060w ist vermerkt, daß dieses Gen zuvor als nicht essentiell klassifiziert wurde. Unter Verwendung des CEN.PK2 Stammes wurde nun überraschenderweise gefunden, daß das YGR060w Gen doch essentiell ist. Darüber hinaus sind in Spalte 8, soweit vorhanden, weitere Informationen z.B. bzgl. der Funktion der als essentiell identifizierten Gene oder der kodierten Proteine und/oder Homologien/Ähnlichkeiten zu anderen Genen oder Proteinen angegeben.

Die Angaben in Tabelle 6 unterstreichen, daß obwohl die DNA-Sequenzen der S. cerivisae Gene (Spalte 2) bekannt sind, über die Funktion, oder die charakteristischen Eigenschaften dieser Gene bzw. der kodierten Proteine bisher kaum etwas bekannt ist und auch die essentielle Funktion dieser Gene oder der durch diese Gene kodierten Proteine bisher nicht bekannt war.

Unter dem systematischen Gennamen (Spalte 2 in Tabelle 6) sind die Sequenzen der als essentiell identifizierten Gene in Gendatenbanken, z.B. den o.g. zugänglich. Die Erfindung betrifft die Verwendung der essentiellen Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YCR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w,

YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w.

Ausgehend von dem Stamm CEN.PK2 (Scientific Research & Technologie GmbH, Oberursel, Deutschland) wurden unter Verwendung einer der drei genannten Methoden die in Tabelle 6, Spalte 1 genannten Saccharomyces cerevisiae Stämme CEN.EN27, CEN.EN28, CEN.EN8, CEN.RO23, CEN.RO30, CEN.RO6, CEN.RO8, CEN.SR14, CEN.SR15, CEN.SR2, CEN.SR26, CEN.SR41, CEN.SR55, CEN.SR66, CEN.SR80, CEN.SR81, CEN.HE1, CEN.HE17, CEN.HE18, CEN.HE2, CEN.HE4, CEN.HE9, CEN.HI10, CEN.HI23, CEN.HI28, CEN.HI31, CEN.HI5, CEN.HI7, CEN.FE8, CEN.KR28, CEN.TS02, CEN.TS04 und CEN.ZI26 erzeugt. Diese Stämme sind dadurch definiert, daß die in Tabelle 6, Spalte 4 angegebenen Nukleotide (bzw. die in Spalte 5 angegebenen Aminosäuren) durch die in Tabelle 6, Spalte 3 angegeben Selektionsmarker ersetzt wurden.

Die Erfindung betrifft die Stämme CEN.EN27, CEN.EN28, CEN.EN8, CEN.RO23, CEN.RO30, CEN.RO6, CEN.RO8, CEN.SR14, CEN.SR15, CEN.SR2, CEN.SR26, CEN.SR41, CEN.SR55, CEN.SR66, CEN.SR80, CEN.SR81, CEN.HE1, CEN.HE17, CEN.HE18, CEN.HE2, CEN.HE4, CEN.HE9, CEN.HI10, CEN.HI23, CEN.HI28, CEN.HI31, CEN.HI5, CEN.HI7, CEN.FE8, CEN.KR28, CEN.TS02, CEN.TS04 und CEN.ZI26 sowie Verfahren zur Herstellung dieser Stämme und die Verwendung dieser Stämme.

Eine Ausführungsform des Verfahrens ist, daß die essentiellen Gene von Saccharomyces cerevisiae, insbesondere die Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w oder Teile derselben eingesetzt werden, um korrespondierende Gene, insbesondere sequenz- und/oder funktionsähnliche Gene, in anderen Myceten zu identifizieren.

14

Sequenzhomologe Gene können nach bekannten Verfahren z. B. mit Hilfe des Homologiescreenings (Sambrook, J. et al. (1989) Molecularcioning. Cold Spring Harbor Laboratory Press, N. Y.) oder mit Hilfe der PCR-Technik unter Verwendung von spezifischen Primern aus genomischen Banken und/oder cDNA Banken der entsprechenden Myceten isoliert werden.

Funktionsähnliche Gene in anderen Mycetenspezies sind Gene, die in dem anderen Mycetenspezies eine ähnliche oder die gleiche Funktion innehaben wie die identifizierten essentiellen Gene in S. cerevisiae. Die funktionsähnlichen Gene können gegebenenfalls funktionshomolog zu den entsprechenden S. cerevisiae Genen sein. Funktionsähnliche Gene können gegebenfalls sequenzhomolog zu den entsprechenden essentiellen S. cerevisiae Genen sein. Funktionsähnliche bzw. funktionshomologe Gene aus anderen Myceten kodieren vorzugsweise für Proteine, die in ihrer Funktion den entsprechenden S. cerevisiae Proteinen ähnlich sind (funktionsähnliche Froteine) bzw. die in ihrer Funktion zu den entsprechenden S. cerevisiae Proteinen homolog sind (funktionshomologe Proteine). Funktionsähnliche bzw. funktionshomologe Gene aus anderen Myceten bzw. die durch diese Gene kodierten Proteine können die Funktion des entsprechenden essentiellen S. cerevisiae Gens bzw. des durch dieses Gen kodierten Proteins ganz oder teilweise komplementieren.

Die Erfindung betrifft deshalb auch Verfahren mit denen Gene in anderen Myceten identifiziert werden können, die zu den essentiellen Genen in S. cerevisiae funktionsähnlich sind. Die Erfindung betrifft insbesondere Verfahren zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen in anderen Myceten, wobei die essentiellen Gene aus Saccharomyces cerevisiae eingesetzt werden.

Vorzugsweise werden in diesen Verfahren zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen in anderen Myceten Saccharomyces cerevisiae Zellen erzeugt, in denen ein essentielles Gen von Saccharomyces cerevisiae unter die Kontrolle eines regulierbaren Promotors gestellt wird. Die auf auf diese Weise veränderten Saccharomyces cerevisiae Zellen werden dann vorzugsweise unter Wachstumsbedingungen angezogen, unter denen der regulierbare Promotor aktiv

15

ist und die veränderten S. cerevisiae Zellen mit cDNA, die aus der anderen Mycetenspezies hergestellt wurde und in einem Expressionsvektor vorliegt, transformiert, woraufhin der regulierbare Promotor, beispielsweise durch Veränderung der Kulturbedingungen, abgeschaltet wird, so daß auf diese Weise die Saccharomyces cerevisiae Zellen selektiert werden, in denen die cDNA, die für ein funktionsähnliches Protein aus der anderen Mycetenspezies kodiert, exprimiert wird.

Aus den selektierten S. cerevisiae Zellen kann dann gegebenfalls die cDNA, die das zu dem essentiellen Gen von Saccharomyces cerevisiae funktionsähnliche Gen aus der anderen Mycetenspezies repräsentiert, isoliert und analysiert wird. Auf diese Weise ist direkt die kodierende Sequenz eines funktionsähnlichen Gens aus einer anderen Mycetenspezies zugänglich. Mit Hilfe der cDNA kann nach bekannten Verfahren, z.B. mit Hilfe des Homologiescreenings einer genomischen Bank hergestellt aus der anderen Mycetenspezies, das funktionsähnliche Gen in der anderen Mycetenspezies identifiziert werden. Auf diese Weise sind dann auch die regulatorischen Sequenzen, z.B. Promotor und Enhancer des funktionsähnlichen Gens zugänglich.

In einem solchen Verfahren wird vorzugsweise eines der essentiellen Gen von Saccharomyces cerevisiae ausgewählt aus der Gruppe der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w unter die Kontrolle eines regulierbaren Promotors gestellt.

Zur Auffindung von funktionsähnlichen Genen in anderen Myceten kann beispielsweise aus einer zu untersuchenden Mycetenspezies mRNA nach bekannten Verfahren isoliert (Sambrock et al., 1989) und nach ebenfalls bekannten Verfahren aus der mRNA cDNA hergestellt (Sambrock et al., 1989; oder cDNA Synthese Kits, z. B. Firma Stratagene) werden.

Die hergestellte cDNA kann gerichtet in einen geeigneten Expressionsvektor integriert werden.

Beispielsweise kann die Synthese des ersten cDNA Strangs in Gegenwart von Primern durchgeführt werden, die geeignete Restriktionsschnittstellen aufweisen, um eine spätere Klonierung in der richtigen Orientierung vor den jeweiligen Promotor des Expressionsvektors ermöglichen. Als Restriktionsschnittstellen können alle bekannten Restriktionsschnittstellen verwendet werden. Als Primer kann beispielsweise der nachfolgend beschriebene ca. 50 Nukleotide lange Primer verwendet werden.

Die Sequenz (X)₆ steht für eine geeignete Restriktionsschnittstelle, beispielsweise für Xhol.

Nach der Zweitstrang-Synthese können die kohäsiven Enden der doppelsträngigen cDNA aufgefüllt (blunt end) und die Enden der cDNA dann mit geeigneten DNA-Adaptersequenzen ligiert werden. Die DNA-Adaptersequenzen sollten eine Restriktionsschnittstelle beinhalten, die verschieden von der Restriktionsschnittstelle sein sollte, die in dem Primer für die Synthese des ersten cDNA-Stranges verwendet wurde. Die DNA-Adapter können beispielsweise aus 9-und 13-mer Oligonukleotiden, die zueinander komplementär sind und an ihrem Ende das kohäsive Ende einer Restriktionsschnittstelle darstellen, bestehen. Beispielsweise können diese Enden eine EcoRI-Schnittstelle sein:

Die X in der dargestellten Adaptersequenz stellen das kohäsive Ende einer Restriktionsschnittstelle dar.

Die mit entsprechenden Adaptersequenzen versehene cDNA wird anschließend mit der Restriktionsendonuklease, deren Erkennungsstelle im Primer für die Synthese des ersten cDNA Strangs verwendet wurde, geschnitten, beispielsweise mit Xhol. Die erhaltene cDNA hätte in diesem Beispiel somit an ihrem 3'-Ende ein Xhol und am 5'-Ende ein EcoRl überstehendes Ende und könnte somit gerichtet in einen mit der Restriktionsenzymen Xhol und Eco Rl geschnittenen Expressionsvektor integriert werden.

Als Expressionsvektoren eignen sich unter anderem E. coli/S. cerevisiae Pendel-Vektoren d. h. Vektoren, die sowohl für E. coli als auch für S. cerevisiae verwendet werden können. Solche Vektoren können dann z. B. in E. coli vermehrt werden. Als Expressionsvektoren können sowohl solche Vektoren, die in hoher als auch solche, die in niedriger Kopien-Zahl in S. cerevisiae Zellen vorliegen, verwendet werden. Hierfür eignen sich beispielsweise Vektoren aus der Serie pRS423 - pRS426 (pRS423, pRS424, pRS425, pRS426) bzw. pRS313 -pRS316 (pRS313, pRS314, pRS315, pRS316) (Sikorski, R.S. und Hieter P., (1989) Genetics 122: 19 - 27; Christianson, T. W. et al., (1992) Gene 110: 119 - 122).

Die Expressionsvektoren sollten geeignete S. cerevisiae Promotoren und Terminatoren aufweisen. Haben die verwendeten Expressionsvektoren diese nicht, so werden entsprechende Promotoren und Terminatoren so inseriert, daß ein nachfolgender Einbau der erzeugten cDNA möglich bleibt. Insbesondere eigenen sich die Promotoren der S. cerevisiae Gene MET25, PGK1, TPI1, TDH3, ADHI, URA3. Es können sowohl Promotoren der Wildtyp-Gene in unveränderter Form als auch Promotoren, die in der Art verändert wurden, daß bestimmte Aktivatorsequenzen und/oder Repressorsequenzen entfernt wurden, verwendet werden. Als Terminatoren eignen sich beispielsweise die Terminatoren der S. cerevisiae Gene MET25, PGK1, TPI1, TDH3, ADHI, URA3.

In Verfahren zur Auffindung von funktionsähnlichen Genen in anderen Mycetenspezies, wird ein essentielles Gen von S. cerevisiae ausgewählt und dieses Gen entweder integrativ (1) oder extrachomosomal (2) unter die Kontrolle eines regulierbaren Promotors gestellt.

WO 98/44135

18

PCT/EP98/01904

1. Für die Integration eines regulierbaren Promotors in das S. cerevisiae Genom, wird dieser gegen den nativen Promoter des ausgewählten essentiellen Gens ausgetauscht, beispielsweise mittels PCR-vermittelter homolger Rekombination (Güldener et al., 1996). Die PCR-vermittelte homologe Rekombination kann beispielsweise in dem diploiden S. cerevisiae Stamm CEN.PK2 durchgeführt werden. Die genetische Aufspaltung kann durch Tetraden-Analyse überprüft werden.

Bei der Tetraden-Analyse werden vier lebensfähige Ascosporen erhalten, wobei das ausgewählte essentielle Gen bei zwei haploiden Segreganten unter der Kontrolle des nativen Promotors steht, während das essentielle Gen bei den beiden anderen Segreganten unter der Kontrolle des regulierbaren Promotors steht. Die letztgenannten haploiden Segreganten werden für die Transformation mit der in dem Expressionsvektor vorliegenden cDNA eingesetzt.

2. Bei der extrachromosomalen Variante wird zunächst das ausgewählte essentielle Gen von S. cerevisiae mit der in dem Expressionsvektor vorliegenden cDNA hinter einen regulierbaren S. cerevisiae Promotor in einen geeigneten Expressionsvektor inseriert, beispielsweise einen E. coli/ S. cerevisiae Pendel-Vektor. Beispielsweise kann dazu das essentielle Gen mittels PCR an genomischer DNA von S. cerevisiae vom ATG Start -Codon bis einschließlich der Terminationssequenz amplifiziert werden. Die dazu eingesetzten Primer können so konstruiert werden, daß sie Erkennungsstellen für geeignete Restriktionsenzyme enthalten, die eine nachfolgende Insertion hinter den regulierbaren Promotor eines Expressionsvektors erleichtern.

Der rekombinante Expressionsvektor mit einer plasmidkodierten Kopie des ausgewählten essentiellen S. cereviaise Gens unter der Kontrolle eines regulierbaren Promotors dient nachfolgend zur Transkomplementation des entsprechenden Mutanten-Allels. Das entsprechende Mutanten-Allel kann aus den in Tabelle 6 aufgeführten, durch homloge Rekombination hergestellten heterozygot-diploiden Mutanten-Stämmen (1. Spalte in Tabelle 6) ausgewählt werden.

19

Der Expressionsvektor mit dem ausgewählten essentiellen S. cerevisiae Gen wird in den entsprechenden heterozygot-diploiden Mutanten-Stamm, der anstelle des ausgewählten essentiellen S. cerevisiae Gens das Gen eines Selektionsmarkers trägt, transformiert. Die Transformanden werden durch Selektion auf den im verwendeten Expressionsvektor enthaltenen Auxotrophie- bzw. Nukleobasen-Marker isoliert. Die erhaltenen transformierten heterozygot-diploiden Mutanten-Stämme werden einer Tetraden-Analyse unterzogen. Dabei werden vier lebensfähige Segreganten erhalten. Durch Rückverfolgung der entsprechenden Marker des Mutanten-Allels und des Expressionsvektors lassen sich transformierte Wildtyp-Segreganten von Segreganten, bei denen die genomische Kopie des essentiellen Gens entfernt wurde, unterscheiden. Segreganten, bei denen die genomische Kopie des ausgewählten essentiellen Gens entfernt wurde, werden als trans-komplementierte haploide Mutanten-Stämme bezeichnet. Sie werden für die Transformation mit der in dem Expressionsvektor vorliegenden cDNA der zu untersuchenden Mycetenspezies eingesetzt.

Insbesondere werden heterozygot-diploide Saccharomyces cerevisiae Zellen, bei denen eines der essentiellen Gene durch ein Markergen ersetzt ist, mit einem rekombinanten Expressionsvektor, der den kodierenden Teil des essentiellen Saccharomyces cerevisiae Gens unter der Kontrolle eines regulierbaren Promotors enthält, transformiert. Beispielsweise wird in den heterozygot-diploiden Saccharomyces cerevisiae Zellen ein essentielles Gen durch ein Gen, das für einen Auxotrophiemarker kodiert oder durch ein Resistenzgen ersetzt.

In dem Verfahren werden vorzugsweise Saccharomyces cerevisiae Zellen des Stammes CEN.PK2 verwendet. Es werden darüberhinaus mit diesem Stamm vorzugsweise Saccharomyces cerevisiae Zellen erzeugt werden, in deren Genom der native Promotor des essentiellen Gens durch einen regulierbaren Promotor ersetz wird oder solche Zellen, bei denen der native Promoter des essentiellen Gens extrachromosomal durch einen regulierbaren Promotor ersetzt wird.

Die Erfindung betrifft die Verwendung von Saccharomyces cerevisiae Zellen der Stämme CEN.EN27, CEN.EN28, CEN.EN3, CEN.RO23, CEN.RO30, CEN.RO6,

CEN.RO8, CEN.SR14, CEN.SR15, CEN.SR2, CEN.SR26, CEN.SR41, CEN.SR55, CEN.SR66, CEN.SR80, CEN.SR81, CEN.HE1, CEN.HE17, CEN.HE18, CEN.HE2, CEN.HE4, CEN.HE9, CEN.HI10, CEN.HI23, CEN.HI28, CEN.HI31, CEN.HI5, CEN.HI7, CEN.FE8, CEN.KR28, CEN.TS02, CEN.TS04 und CEN.ZI26 in einem Verfahren zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen und/oder funktionsähnlichen Proteinen in anderen Myceten, insbesondere zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen in Candida albicans und Aspargillus fumigatus. Darüber hinaus betrifft die Erfindung die Verwendung dieser Saccharomyces cerevisiae Zellen zur Identifizierung von funktionsähnlichen menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Genen bzw. der durch diese Gene kodierten Proteine (bzw. zur Überprüfung, ob funktionsähnliche menschliche, tierische oder pflanzliche Gene bzw. der durch solche Gene kodierten Proteine überhaupt existieren).

Als regulierbare Promotoren können aktivierbare und/oder nicht aktivierbare bzw. reprimierbare Promotoren eingesetzt werden. Diese Promotoren können aus natürlich und/oder künstlich angeordneten Promotorsequenzen bestehen.

Als regulierbare Promotoren können beispielsweise die Promotoren der Gene GAL1 und entsprechende Promotor-Derivate, beispielsweise solche, bei denen verschiedene UAS (upstream activatory sequence)-Elemente entfernt wurden (GALS, GALL; Mumberg, J. et al., (1994) Nucleic Acids Research 22: 5767 - 5768) verwendet werden. Als regulierbare Promotoren können auch die Promotoren gluconeogenetischer Gene, wie z.B. FBP1, PCK1, ICL1 oder Teile davon, beispielsweise deren Aktivator- (UAS1 bzw. UAS2) oder Repressor- (URS, upstream repression sequence) Sequenzen eingesetzt werden (Niederacher et al. (1992) Curr. Genet. 22: 363 - 370; Proft et al. (1995) Mol. Gen. Genet. 246: 367 - 373; Schüller et al., (1992) EMBO J. 11: 107 - 114; Guarente et al., (1984) Cell 36: 503 - 511).

Das Verfahren beinhaltet, daß ein auf diese Weise veränderter S. cerevisiae Mutanten-Stamm (d.h. mit regulierbarem Promotor) unter Wachstumsbedingungen angezogen wird, unter denen der regulierbare Promotor aktiv ist, so daß das essentielle S. cervisae Gen exprimiert wird. Die S. cerevisiae Zellen werden dann

21

mit einer repräsentativen Menge des rekombinanten Expressionsvektors, der die cDNA der zu untersuchenden Mycetenspezies enthält, transformiert. Die Transformanden exprimieren dann zusätzlich das Protein, dessen cDNA in dem rekombinanten Expressionsvektor vorliegt.

Das Verfahren beinhaltet, daß die Wachstumsbedingungen in der Weise verändert werden, daß der regulierbare Promotor unter dessen Kontrolle das ausgewählte essentielle Gen von S. cerevisiae exprimiert wird, abgeschaltet wird. Beispielsweise können die Wachstumsbedingungen durch einen Wechsel des Mediums verändert werden. Wenn beispielsweise der GAL1 Promotor oder ein Derivat dieses Promotors verwendet wird, kann von einem Medium mit Galaktose (induzierter Zustand) zu Glukose haltigem Medium (reprimierter Zustand) gewechselt werden.

Diese veränderten Bedingungen sind für die S. cerevisiae Zellen, in denen der rekombinante Expressionsvektor nicht die cDNA des funktionsähnlichen Gens der anderen Mycetenspezies trägt (d.h. in denen die Funktion des essentiellen Gens nicht durch ein funkrtionsähnliches Gen komplementiert werden kann), letal. Dagegen können S. cerevisiae Zellen überleben, in denen ein funktionsähnliches Gen der anderen Mycetenspezies exprimiert wird, da diese Zellen den letalen Stoffwechseldefekt mit dem durch das funktionsähnliche Gen kodierten Protein komplementieren können.

Das Verfahren beinhaltet, daß aus den überlebenden Transformanden der Expressionsvektor (das Plasmid) nach bekannten Verfahren isoliert wird (Strathern, J. N. und Higgins, D. R. (1991) Recovery of Plasmids from Yeast into Escherichia coli: Shuttle Vectors in: Guthrie, C. und Fink, G. R. Methods in Enzymology. Volume 194. Guide to yeast genetics and molecular biology. Academic Press, San Diego, 319 - 329) und die cDNA mit Methoden der DNA-Analyse, beispielsweise mit Hilfe der DNA Sequenzierung, analysiert wird (Sanger et al., (1977) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74; 5463 - 5467).

Das Verfahren beinhaltet, daß essentielle Gene aus S. cerevisiae eingesetzt werden, um funktionsähnliche und/oder sequenzhomologe Gene in anderen

į

Myceten, insbesondere Gene funktionsähnlicher und/oder sequenzhomologer human-, tier und pflanzenpathogener Myceten zu identifizieren. Beispielsweise können dafür Myceten der Klassen Phycomyceten oder Eumyceten, besonders der Unterklassen Basidiomyceten, Ascomyceten, insbesondere Hemiascomycetales (Hefen) und Plectascales (Schimmelpilze) und Gymnascales (Haut- und Haarpilze) oder der Klasse Hyphomyceten, insbesondere der Unterklassen Conidiosporales (Hautpilze) und Thallosporales (Sproßpilze), wobei insbesondere die Gattungen Mucor, Rhizopus, Coccidioides, Paracoccidioides (brasiliensis) (Blasomyces brasiliensis), Endomyces (Blastomyces), Aspergillus, Penicillium (Scopulariopsis), Trichophyton (Ctenomyces), Epidermophyton, Microsporon, Piedraia, Hormodendron, Phialophora, Sporotrichon, Cryptococcus, Candida, Geotrichum und Trichosporon verwendet werden.

Besonders hervorzuheben ist die Verwendung von Candida albicans, Aspargillus fumigatus, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blasomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliens und Sporothrix schenckii.

Das Verfahren beinhaltet, daß essentielle Gene aus Saccharomyces cerevisiae und funktionsähnliche Gene aus anderen Myceten eingesetzt werden, um Substanzen zu identifizieren, die die funktionelle Expression dieser essentiellen Gene aus S. cerevisiae bzw. der funktionsähnlichen Gene und/oder die funktionelle Aktivität der kodierten Proteine ganz oder teilweise inhibieren können. Vorzugsweise sind die funktionsähnlichen Genen bzw. die durch diese Gne kodierten Proteine in den anderen Myceten ebenfalls essentiell. Mit Hilfe dieses Verfahren können Substanzen identifiziert werden, die das Wachstum von Myceten inhibieren und die als Antimykotika, beispielsweise zur Herstellung von Arzneimitteln, eingesetzt werden können.

Ein besonderes Merkmal des Verfahrens ist, daß für das Screening der Substanzen essentielle Gene aus Saccharomyces cerevisiae bzw. funktionsähnliche Gene aus anderen Myceten, insbesondere solche, die für die andere Mycetenspezies essentiell sind, als Targets eingesetzt werden. Das Verfahren beinhaltet, daß als Targets sowohl die essentiellen Gene aus S. cerevisiae, als auch funktionsähnliche

23

und/oder sequenzhomologe der essentiellen S. cerevisiae Gene aus anderen Myceten verwendet werden können.

Eine Ausführungsform des Verfahrens ist, daß Zellen, insbesondere Mycetenzellen, die ein essentielles Gen, das als Target eingesetzt wird überexprimieren, bereitgestellt werden und daß diese Zellen mit einer zu testenden Substanz inkubiert werden. Auf diese Weise kann die wachstumsinhibierende Wirkung dieser Substanz im Bezug auf das essentielle Target-Gen bestimmt werden. Ein einzelnes Gen, welches in diesem Verfahren untersucht wird, wird auch als Target-Gen bzw. zu untersuchendes Gen bezeichnet. Ein Target Gen kann ein essentielles S. cerevisiae Gen, insbesondere eines der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w oder YLL003w sein oder ein funktionsähnliches Gen aus einer anderen Mycetenspezies sein.

In dem Verfahren wird der wachstumsinhibierende Effekt einer Substanz auf eine Zelle, in der ein Target-Gen überexprimiert wird, bestimmt. Dabei kann die Substanz entweder die Expression des essentiellen Gens oder des funktionsähnlichen Gens und/oder die funktionelle Aktivität des kodierten Proteins inhibieren.

Eine weitere Ausführungsform ist, daß Zellen, insbesondere Mycetenzellen, die ein Target-Gen in unterschiedlichem Maße exprimieren, bereitgestellt werden und daß diese Zellen dann mit einer zu testenden Substanz inkubiert werden und die wachstumsinhibierende Wirkung dieser Substanz auf die Zellen vergleichend bestimmt wird.

Das Verfahren beinhaltet, daß zwei oder mehrere Zellen, insbesondere Mycetenzellen, beziehungsweise davon abgeleitete Stämme, die sich dadurch unterscheiden, daß sie das Target-Gen in unterschiedlichem Maße exprimieren, verwendet werden. Beispielsweise können zwei, drei, vier, fünf, zehn oder mehr Zellen bzw. die dazu korrespondierenden Stämme im Bezug auf die

24

wachstumsinhibierende Wirkung einer Substanz, die in einer definierten Konzentration eingesetzt wird, vergleichend analysiert werden. Durch solche Konzentrationsreihen können beispielsweise antimykotisch wirkende Substanzen von cytotoxischen oder nicht wirksamen Substanzen unterschieden werden.

Eine besondere Ausführungsform des Verfahrens ist, daß haploide Mycetenzellen/ Stämme für das Screening eingesetzt werden, insbesondere können haploide S. cerevisiae Zellen/Stämme dafür verwendet werden.

Das Verfahren beinhaltet, daß das als Target ausgewählte essentielle Gen in einen geeigneten Expressionsvektor integriert wird.

Als Expressionsvektoren eignen sich beispielsweise E. coli/S. cerevisiae Pendel-Vektoren. Insbesondere können Vektoren eingesetzt werden, die sich in ihrer Kopienzahl pro Zelle unterscheiden. Beispielsweise können einerseits Vektoren verwendet werden, die in hoher Kopien-Zahl in transformierten S. cerevisiae Zellen vorliegen als auch solche Vektoren, die in niedriger Kopienzahl vorliegen. Eine Ausführungsform ist, daß Expressionsvektoren eingesetzt werden, die eine Integration des Target-Gens ins S. cerevisiae Genom erlauben.

Als Expressionsvektoren eignen sich beispielsweise die Vektoren pRS423, pRS424, pRS425, pRS426, pRS313, pRS314, pRS315, pRS316, pRS303, pRS304, pRS305, pRS306 (Sikorski und Hieter, 1989; Christianson, et al., 1992).

Die Vektoren der Serie pRS423-pRS426 liegen in hoher Kopienzahl (etwa 50 - 100 Kopien/Zelle) vor. Im Gegensatz dazu liegen die Vektoren der Serie pRS313-pRS316 in niedriger Kopienzahl (1 - 2 Kopien/Zellen) vor. Werden Expressionsvektoren aus diesen beiden Serien verwendet, dann liegt das Target-Gen als extrachromosomale Kopie vor. Mit Hilfe der Vektoren der Serie pRS303-pRS306 können die Target-Gene ins Genom integriert werden. Durch die Verwendung dieser drei verschiedenen Expressionsvektor-Typen, die sich nur bezüglich ihrer in S. cerevisiae Zellen vorliegenden Kopienzahl unterscheiden, ist

25

eine differenzierte bzw. abgestufte Expression des essentiellen S. cerevisiae Gens bzw. des funktionsähnlichen Gens möglich.

Das Verfahren beinhaltet, daß vergleichend die wachstumsinhibierende Wirkung von Substanzen im Bezug auf Zellen (z.B. Mycetenzellen)/Stämme, die mit unterschiedlichen Expressionsvektoren, die sich z. B. in der Kopienzahl des Vektors/Zelle unterscheiden, bestimmt wird. Solche Zellen können das essentielle Target-Gen in unterschiedlichem Maße exprimieren und eine abgestufte Reaktion auf die Substanz zeigen.

Das Verfahren beinhaltet auch, daß eine unterschiedlich starke Expression des Target-Gens in verschiedenen Zellen, insbesondere Mycetenzellen (geregelte Überexpression) dadurch erreicht wird, daß das Target-Gen in Expressionsvektoren zwischen speziell ausgewählte Promotoren und Terminatoren, beispielsweise S. cerevisiae Promotoren und Terminatoren inseriert wird. Beispielsweise eignen sich dafür Promotoren der S. cerevisiae Gene die konstitutiv, aber unterschiedlich stark exprimiert werden. Beispiele für solche Promotoren sind die nativen Promotoren der S. cerevisiae Gene MET25, PGK1, TPI1, TDH3, ADHI, URA3, TRP1, sowie entsprechende Derivate dieser Promotoren, beispielsweise Promotor-Derivate, die bestimmte Aktivatorsequenzen und/oder Repressorsequenzen nicht enthalten.

Für die geregelte Überexpression des Target-Gens eignen sich auch regulierbare Promotoren. Beispielsweise können die nativen Promotoren der Gene GAL1 bzw. entsprechende Derivats der Promotoren, z. B. solche, bei denen verschiedene UAS-Elemente entfernt wurden (GALS, GALL; Murnberg et al., (1994) Nucleic Acids Research 22: 5767 - 5768) sowie Promotoren giuconeogenetischer Gene, z. B. die Promotoren FBP1, PCK1, ICL1 oder Teile dieser Promotoren, z. B. deren Aktivator-(UAS1 bzw. UAS2) oder Repressor- (URS) Sequenzen in entsprechenden nicht aktivierbaren bzw. reprimierbaren Test-Promotoren (Schüller et al., (1992) EMBO J. 11: 107 - 114) Guarente et al., (1984) Cell 36: 503 - 511; Niederacher et al. (1992) Curr. Genet. 22: 363 - 370; Proft et al. (1995) Mol. Gen. Genet. 246: 367 - 373;) eingesetzt werden.

1

26

In den Expressionsvektoren können als Terminatoren beispielsweise die Terminatorsequenzen der S. cerevisiae Gene MET25, PGK1, TPI1, TDH3, ADHI, URA3 verwendet werden.

Das Verfahren beinhaltet, daß durch die Verwendung, geschickt ausgewählter Expressionsvektor-Typen und/oder die Herstellung von geeigneten Expressionsvektoren, gegebenenfalls unter Benutzung verschiedenen starker Promotoren und/oder unterschiedlich regulierter Promotoren, eine Reihe von Expressionsvektoren hergestellt werden können, die alle das gleiche Target-Gen enthalten, sich aber dadurch unterschieden, daß sie das Target-Gen in unterschiedlichem Maße (unterschiedlich stark) exprimieren. Mit Hilfe solcher Reihen von Expressionsvektoren ist es möglich, eine in ihrer Stärke fein abgestufte Expression des Target-Gens zu erzielen. Mit Hilfe solcher Reihen von Expressionsvektoren ist es möglich, Mycetenzellen/Mycetenstämme herzustellen, die das Target-Gen in unterschiedlichem Maße exprimieren.

Das Verfahren beinhaltet, daß die Expressionsvektoren in haploide Wildtyp-Zellen von S. cerevisiae transformiert werden. Die so erhaltenen Zellen/Stämme werden in Flüssigmedium angezogen, mit verschiedenen Konzentrationen der zu untersuchenden Substanz inkubiert und die Wirkung dieser Substanz auf das Wachstumsverhalten der Zellen/Stämme vergleichend analysiert, die das Target-Gen in unterschiedlichem Maße exprimieren. Das Verfahren beinhaltet auch, daß als Referenz haploide S. cerevisiae Zellen/Stämme, die mit dem jeweiligen Expressionsvektor-Typ ohne Target-Gen transformiert wurden, verwendet werden.

Das Verfahren beinhaltet, daß bei der Verwendung von regulierbaren Promotoren, insbesondere beim Einsatz des GAL1 Promotors und dessen Derivaten (GALS und GALL) das Screening von Substanzen in verschiedenen Medien durchgeführt werden kann, da hier die Expressionsstärke durch die Wahl des jeweiligen Mediums stark zu beeinflussen ist. So nimmt die Expressionsstärke des GAL1 Promotors in folgender Weise ab: 2 % Galaktose > 1 % Galaktose + 1 % Glukose > 2 % Glycerin > 2 % Glukose.

27

Die wachstumsinhibierende Wirkung von Substanzen, die Wildtyp-Zellen von S. cerevisiae in ihrem Wachstum inhibieren, kann durch die Überexpression des essentiellen S. cerevisiae Gens bzw. des funktionsähnlichen Gens aus einer anderen Mycetenspezies ganz oder teilweise aufgehoben werden.

Das Verfahren beinhaltet auch, daß funktionsähnliche und/oder sequenzhomologe der essentiellen S. cerevisiae Gene beim Menschen, bei Tieren oder Pflanzen identifiziert werden. Die entsprechenden menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Gene könnten ebenfalls als Target-Gene in dem Verfahren eingesetzt werden, um zu Überprüfen, ob antimykotisch wirkende Substanzen auf diese Target-Gene auch eine Wirkung haben. Dies ist ein besonderer Vorteil des Verfahrens, denn auf diese Weise können Substanzen identifiziert werden, die spezifisch das Wachstum von Myceten (bzw. von bestimmten Mycetenspezies) inhibieren. Spezifische antimykotisch wirksame Substanzen sollten auf entsprechende funktionsähnliche und/oder sequenzhomologe menschliche, tierische oder pflanzliche Gen bzw. die durch diese Gene kodierten Protein entweder einen vergleichsweise geringeren bzw. keinen Effekt haben.

Das Verfahren beinhaltet auch die Möglichkeit zu überprüfen, ob überhaupt funktionsähnliche und/oder sequenzhomologe menschliche, tierische oder pflanzliche Gene zu den entsprechenden essentiellen Mycetengenen existieren. Beispielsweise dadurch, daß die Homologie der identifizierten essentiellen Mycetengene oder von Teilen dieser Gene mit den in Datenbanken verfügbaren menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Sequenzen/Genen überprüft wird. Dadurch können aus den identifizierten essentiellen Mycetengenen bereits im Vorfeld, je nach Aufgabenstellung, diejenigen Gene ausgewählt werden, zu denen es z. B. beim Menschen keine sequenzhomologen und/oder funktionsähnlichen Gene gibt.

Dadurch bietet das Verfahren eine Vieizahl von Möglichkeiten gezielt antimykotisch wirkende Substanzen zu identifizieren, die dann z.B. den menschlichen Organismus nicht schädigen. Beispielsweise können Substanzen identifiziert werden, die zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Mykosen oder zur Prophylaxe bei einer Schwächung des Immunsysterns verwendet werden

können. Beispielsweise können diese Substanzen z.B. zur Herstellung von Medikamenten, die zur Behandlung von mykotischen Infektionen, die z.B. im Verlauf der HIV-Infektion bzw. Aids oder Krankheiten wie Diabetis auftreten, eingesetzt werden. Mit Hilfe des Verfahrens können auch Substanzen identifiziert werden, die zur Herstellung von Fungiziden verwendet werden können. Insbesondere zur Herstellung von Fungiziden, die für Mensch und Tier unschädlich sind. Mit Hilfe des Verfahrens können auch spezifische antimykotisch wirksame Substanzen identifiziert werden, die zur Konservierung, z.B. von Lebensmitteln und Körperpflegemitteln verwendet werden können.

Weiterhin bietet das Verfahren auch die Möglichkeit antimykotisch wirksame Substanzen zu identifizieren, die ganz gezielt nur das Wachstum bestimmter Spezies von Myceten inhibieren, da im ersten Schritt mit Hilfe dieses Verfahrens überprüft werden kann, ob in einer anderen Mycetenspezies funktionsähnliche Gene überhaupt existieren. Andererseits können mit Hilfe dieses Verfahrens auch Substanzen identifiziert werden, die gegen eine Vielzahl von Mycetenspezies gleichzeitig wirksam sind ("Breitband-Antimykotika"), da mit Hilfe des Verfahrens in einem ersten Schritt festgestellt werden kann, ob zu einem essentiellen Gen in S. cerevisiae funktionsähnliche Gene in möglichst vielen anderen Mycetenspezies (z.B. humanpathogenen Mycetenspezies) existieren.

Ein besonderer Vorteil des Screeningverfahrens ist, daß es ausreicht zu wissen, daß die verwendeten Gene essentiell sind; über die Funktion der essentiellen Gene oder die Funktion der kodierten Proteine sind keine weiteren Informationen notwendig. Das ist insbesondere für die Identifikation von funktionsähnlichen Genen in anderen Mycetenspezies mit Hilfe der essentiellen Gene von S. cerevisiae vorteilhaft, da von vielen dieser Gene die DNA-Sequenzen nicht verfügbar sind.

Besondere Vorteile des Verfahrens sind:

- Es ist keinerlei Kenntnis über die biochemische Funktion der essentiellen Gene aus S. cerevisiae notwendig. Es können alle Genen im Bezug auf ihre Essentialität untersucht werden, deren Sequenz ganz oder teilweise bekannt ist.
- Mit Hilfe der essentiellen Genen aus S. cerevisiae können funktionsähnliche

Gene aus anderen Mycetenspezies identifiziert werden, wobei wiederum nichts über deren biochemische Funktion bekannt sein muß.

- Darüber hinaus muß auch die Sequenz potentieller funktionsähnlicher Gene aus anderen Mycetenspezies nicht bekannt sein. Es wird nur die Sequenz von identifizierten funktionsähnlichen cDNAs bzw. Genen aufgeklärt.
- In dem Verfahren zum Auffinden antimykotisch wirksamer Substanzen wird nicht differenziert, ob die Substanz die funktionelle Expression des essentiellen bzw. funktionsähnlichen Gens inhibiert oder ob sie die funktionelle Aktivität des kodierten Proteins inhibiert.
- Gleichzeitig kann der Effekt der Substanzen auf funktionsähnliche menschliche, tierische und pflanzlichen Gene bzw. die kodierten Proteine getestet werden bzw. es kann überprüft werden, ob funktionsähnliche bzw. sequenzhomologe Gene überhaupt existieren.
- Einzelne Substanzen können auf diese Weise effizient auf ihre spezifische Wirksamkeit getestet werden.

Beispiele:

Beispiel 1: Die "Klassische Methode" zur Erzeugung von Deletions-Kassetten dargestellt für den YJR141w (Tabelle 6).

Deletion des ORF YJR141w-Gens aus S. cerevisiae unter Verwendung des HIS3-Gens von S. cerevisiae:

- 1) Klonierung eines 1,7kB Xbal-Fragments (enthalten entweder aus genomische S. cerevisiae DNA bzw. aus einem entsprechenden Cosmid-Klon, der das YJR141w-Gen beinhaltet) in einem puC18 Vektor, der mit dem Restriktionsenzym Xbal linearisiert wurde.
- 2) Das aus 1.) erhaltene Plasmid wurde zunächst mit dem Restriktionsenzym BstEll geschnitten und nach dem Auffüllen der überstehenden DNA-Enden mit Hilfe des Enzyms Klenow-Polymerase (Sambrook et al., 1989) das erhaltene lineare

DNA-Fragment mit dem Restriktionsenzym Clal geschnitten. Dadurch wurde ein 3,52kB und ein 0,87kB (Kilobasenpaare) großes DNA-Fragment erhalten.

- 3) Das HIS3-Gen von S. cerevisiae wird als genomisches 1,6kB BamHI-Fragment in den mit dem Restriktionsenzym BamHI geschnittenen Vektor pBluescript IIKS+ (Stratagene) inseriert und auf diese Weise das Plasmid pMR240 hergestellt.
- 4) Das Plasmid pMR240 wurde zunächst mit dem Restriktionsenzym Xhol geschnitten und dann die überstehenden DNA-Enden mit Hilfe der Klenow-Polymerase aufgefüllt. Das lineare DNA-Fragment wurde mit dem Restriktionsenzym Clal geschnitten. Dadurch wurde ein 1,36kB DNA-Fragment, daß das HIS3-Gen von S. cerevisiae enthält, erhalten.
- 5) Das 3,52kB DNA-Fragment aus 2.) wurde mit dem aus 4.) erhaltenen 1,36kB DNA-Fragment ligiert und auf diese Weise das Plasmid pRO6 erzeugt. Im Plasmid pRO6 wurde ein 870Bp langer DNA-Abschnitt des kodierenden Bereichs von YJR 141w deletiert und gegen den Selektionsmarker HIS3 ersetzt.
- 6) Das Plasmid pR06 wurde mit der Restriktionsendonuklease Pvull linearisiert und zur Transformation von S. cerevisiae eingesetzt.

Beispiel 2: Konstruktion von Plasmiden für die SFH-Methode.

- 1) Als Ausgangsvektor wurde der Vektor pBluescript®II KS+ (Stratagene; Sequenz verfügbar: Genbank® X52327) verwendet.
- 2) Der Vektor pBluescript®II KS+ wurde mit dem Restriktionsenzym NotI linearisiert und die überstehenden Enden durch anschließende Inkubation mit Mungbohnen 5'-3'Exonuklease entfernt. Durch Religation des verkürzten DNA-Fragments wurde der Vektor pKS÷ΔNotI hergesteilt (Vektor pBluescript®II KS ohne die NotI Restriktionsschnittstelle).

3) Das Plasmid pKS+ΔNotI wurde mit den Restriktionsenzymen PstI und BamHI geschnitten und das DNA-Oligonuleotid, welches aus dem Primer-Paar PK3/PK4 erzeugt wurde, in das geöffnete Plasmid ligiert. Das auf diese Weise erzeugte Plasmid pKS+neu (SEQ ID. NO. 17) enthält zwischen der PstI und BamHI Restriktionsschnittstelle die neuen Restriktionsschnittstellen NotI, StuI, SfiI und NcoI:

Pstl-Notl-Stul-Sfil-Ncol-BamHI

SEQ ID NO. 3: 5'-GCGGCCGCAAGGCCTCCATGGCCG-3' PK3
SEQ ID NO. 4: 5'-GATCCGGCCATGGAGGCCTTGCGGCCGCTGCA-3' PK4

4) Das Plasmid pKS+neu (SEQ ID. NO. 17) diente als Ausgangsvektor zur Herstellung der Plasmide pPK5/6 (SEQ ID NO. 18), pPK7/8 (SEQ ID NO. 19), pPK9/10 (SEQ ID NO. 20) und pPK13/14 (SEQ ID NO. 21). Die Gene für die entsprechenden Aminosäure-/Nukleobasen-Auxotrophie-Marker wurden mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer an den Wildtyp- bzw. modifizierten Wildtyp-Genen (Beispiel 4 und Beispiel 5) amplifiziert.

Beispiel 3: Konstruktion des Plasmids pPK5/6 (pKS+neu - HIS 3) (SEQ ID NO. 18):

Unter Verwendung der Primer PK5 und PK6 wurde mittels PCR an genomischer S. cerevisiae DNA das HIS3-Gen amplifiziert, anschließend mit den Restriktionsenzymen BamHI und NotI geschnitten und in das mit BamHI und NotI geschnittene Plasmid pKS+neu inseriert. Die unterstrichenen DNA-Abschnitte der Primer entsprechen den Abschnitten, die der jeweiligen homologen Sequenzen der S. cerevisiae Gene entsprechen.

..Noti..

SEQ ID NO. 5: 5'-ATCTGCAGCGGCCGCGTTTTAAGAGCTTGGTGAGCGC-3' PK5

Pati
....Sfii.....

32

SEQ ID NO. 6: 5'-ATGGATCCGGCCATGGAGGCCTCGTTCAGAATGACACGTAT-3' PK6
BamHI

Beispiel 4: Konstruktion des Plasmids pK7/8 (pKS+neu - LEU2) (SEQ ID NO. 19):

Unter Verwendung der Primer PK7 und PK8 wurde mittels PCR an Ycplac111 Vektor-DNA (Gietz, R. D. und Sugino, A. (1988) Gene 74: 527 - 534) als Matrize (modifiziertes Wildtyp-Gen) das LEU2 Gen von S. cerevisiae amplifiziert, die amplifizierte DNA anschließend mit den Restriktionsenzymen BamHI und NotI geschnitten und in ein mit BamHI und NotI geschnittenes Plasmid pKS+neu inseriert.

....SfiI....

SEQ ID No. 7: 5'-ATGGATCCGGCCATGGAGGCCTGTGGGAATACTCAGGTATCG-3' PK7

..NotI..

SEQ ID NO. 8: 5'-ATCTGCAGCGGCCGCGTCTACCCTATGAACATATTCCATT-3' PK8
PstI

Beispiel 5: Konstruktion des Plasmids pPK9/10 (pKS+neu - URA3) (SEQ ID NO. 20):

Unter Verwendung der Primer PK9 und PK10 wurde mittels PCR an Ycplac33 Vektor-DNA (Gietz, R. D. und Sugino, A. (1988) Gene 74: 527 - 534) als Matrize (modifiziertes Wildtyp-Gen) das URA3 Gen von S. cerevisiae amplifiziert, die amplifizierte DNA anschließend mit den Restriktionsenzymen BamHI und Notl geschnitten und in das mit BamHI und Notl geschnittene Plasmid pKS+neu inseriert.

..NotI..

SEQ ID NO. 9: 5'-ATCTGCAGCGGCCG<u>CAAACATGAGAATTGGGTAATAACTG</u>-3' PK9

SEQ ID NO. 10:

....SfiI....

5'-ATGGATCCGGCCATGGAGGC<u>CTTCAAGAATTAGCTTTTCAATTCATC</u>-3' PK10

Beispiel 6: Konstruktion des Plasmids pPK13/14 (pKS+neu - TRP1) (SEQ ID NO. 21):

Unter Verwendung der Primer PK13 und PK14 wurde mittels PCR an genomischer S. cerevisiae DNA das TRP1-Gen amplifiziert, die amplifizierte DNA anschließend mit den Restriktionsenzymen BamHI und PstI geschnitten und in das mit BamHI und PstI geschnittene Plasmid pKS+neu inseriert.

..NotI..

SEQ ID NO. 11: 5'-ATCTGCAGCGGCCGCATTTAATAGAACAGCATCG-3'

PK13

PstI

....SfiI....

SEQ ID NO. 12:

5'-ATGGATCCGGCCATGGAGGCCACACCGCATAGATCGGC-3'

PK14

BamHI

- Beispiel 7: "Klassische Methode" unter Verwendung der PCR-Technik ("Modifizierte klassische Methode") dargestellt für den YGR046w.
- 1) Unter Verwendung der Primer XSL-2N2 und G385-1 (vergleiche Punkt 4.) wurde der 3'-Bereich des YGR046w an genomischer S. cerevisiae DNA als Matrize amplifiziert. Die amplifizierte DNA wurde anschließend mit den Restriktionsenzymen Clal und EcoRI geschnitten und das erhaltene 508Bp DNA-Fragment in das zuvor mit den Restriktionsenzymen Clal und EcoRI geschnittene Plasmid pPK9/10 ligiert. Das resultierende Plasmid wurde mit p119-58 bezeichnet.
- 2) Unter Verwendung der Primer G385-3 und X9R2 (vergleiche Punkt 4.) wurde der 5'-Bereich des YGR046w an genomischer S. cerevisiae DNA als Matrize

amplifiziert. Die amplifizierte DNA wurde anschließend mit den Restriktionsenzymen BamHI und BglII geschnitten und das erhaltene 1336Bp Fragment in das Plasmid p119-58, das zuvor mit BamHI geschnitten worden war, inseriert. Das resultierende Plasmid wurde mit pEN27 bezeichnet.

- Das Plasmid pEN27 wurde nach der Linearisierung mit den Restriktionsenzymen Sacl und Asp7 18 zur Transformation von S. cerevisiae eingesetzt.
- 4) Verwendete Primer:

Beispiel 8:

S. cerevisiae Zellen vom Stamm CEN.PK2 wurden mit jeweils ca. 5 µg DNA einer linearen Deletionskassette nach bekannten Verfahren transformiert (Gietz et al., 1992; Güldener et al., 1996). Der Transformationsansatz wurde auf entsprechenden Selektivmedien ausplattiert.

Bei Verwendung einer Deletionskassette die das Kanamycinresistenzgen enthielt,wurde auf Vollmedium (YEPD) mit Geniticin (G418®) ausplattiert. Bei der Verwendung einer Deletionskassette die sogenannte Auxotrophie-Marker enthielt wurde auf synthetischen Minimalmedien (SCD), die die entsprechende Aminosäure

35

(Histidin, Leucin oder Tryptophan) bzw. Nukleobase (Uracil) nicht enthielten, ausplattiert. Auf diese Weise wurde auf die Transformanden selektioniert, bei denen eine homologe Rekombination stattgefunden hatte, da nur diese Zellen unter den veränderten Bedingungen wachsen konnten.

ubiquitin fusion degradation protein homology to hypothetical protein homology to hypothetical protein homology to RAD4 (Frameshift) similarity to C. elegans ZK632.3 similarity to Emericella nidulans chromosome scaffold protein similarity to adrenoxin and protein; function unknown C-4 sterol methy oxidase ferrrodoxin Bernerkungen YDR190c YNL108c YPD kein Eintrag temperatursensitiv YPD kein Eintrag **DB** Eintrag viable, Name des Gens ERG25 <u> 중</u> UFD1 Aminosäuren (-)77-279 25-710 56-1038 28-450 deletierte 31-1495 21-399 2-555 25-359 10-297 2-172 2-484 2-471 37-110 2-421 9-381 (-)231-83673-2130 82-1352 Nukleotide 4-1665 169-3114 61-1197 91-4485 deletierte 73-1077 4-1236 4-1452 4-1413 18-1143 27-891 110-330 4-516 loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP loxP-KanMX-loxP Selektions-LEU2 HIS3 HIS3 marker **URA3** LEU2 HS3 HIS3 Name des systematischer YOR206w YJL054w YPL235w YNL182c **YOR119c** YPL252c **YOR110w** YPL242c Gen-Name YGR046w YGR048w YGR060w YJR136c YJR141w **YBR167c** YJL074c CEN.SR66 CEN.SR80 CEN.SR15 CEN.SR26 CEN.SR55 CEN.SR14 CEN.SR41 CEN.RO30 CEN.SR2 CEN.EN28 CEN.RO23 CEN.ROS erzeugten CEN.EN27 CEN.EN8 CEN.ROB Stammes

Tabelle 6

		Colobione	deletierte	deletierte	Name des Gens	DB Eintrag	Bemerkungen
Name des	systemanscher	Selection					
erzeugten	Gen-Name	marker	Nukleotide	Aminosauren			
Stammes							cimilarity to UCD70 family
CEN SR81	YJL039c	loxP-KanMX-loxP	4-5049	2-1683			Summer of Tor 10 farming
LIT AUC	YNL258c	TRP1					
CEN HE17	L	loxP-KanMX-loxP					
SEN HETS	L	loxP-KanMX-loxP					probable membrane protein
	1	0.4.2.2			NRD1		plays a role in sequence specific
CEN.HE2	YNL251c	loxP-Kanw.X-loxP)		regulation of nuclear pre m-RNA
							abundancer
		Gvol YMacN Gvol					similarity to bacterial
CEN.HE4	WOCZ-INY	וסאב-גימוווארט-וסאו					dihydropteroate synthas
1	0000 1147	Gvol. XMac V. Gvol					
CENTRA	1	L IDA3					beta transducin repeats
CEN HIG	4	200					similarity to S. pombe cut3 protein
CEN.HI23	YLR086w	loxP-KanMX-loxP					
CEN.HI28	YLR076c	loxP-KanMX-loxP					
רבוע בווא	L	loxP-KanMX-loxP					
21.13	XIDG10	I IRA3					EF-hand calcium binding domain
20.70	and out	240					similarity to E. coli MRP protein;
CEN.HZ	YILGO3W	3					ATPase
	4	11843					hypothetical membrane protein
CENTER	1	0.01					hamology to S. pombe
CEN.KR28	3 YOLO10w	IOXP-Kaniwk-ioxP					SPAC12g12.06c protein
	\perp	Invo-KanMX-loxP					strong similarity to unknown C.
CEN. 150Z	וארמו זכ						elegans protein
LOST ICON	VKI 018w	loxP-KanMX-loxP					
כבוג.	1	5.12			"SFI1"		protein of unknown funktion
CEN.ZI26	YLL003w	LEUZ					

,

.

Tabelle 7: Verwendete Primer für die PCR vermittelte Gendeletion:

SEQ ID NO. 22:	
YPL252c-S1	5' ATA GGC GCT TCT CGT ATC TAT ACT CAA CCC GCC CCC
	AAT GCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3"
SEQ ID NO. 23:	
YPL252c-S2	5' AAA TTG GGG GCA CAA ATG AGG GGT AAA AAT GCA GAC
	ATT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3'
SEQ ID NO. 24:	
YPL242c-S1	5' TCT AAA TCG TTA TGT TGA AAA CCT AGG CAC CAA TGT
	GAC TCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
SEQ ID NO. 25:	
YPL242c-S2	5' CAG CTT TTG CCC AAT ATG CTC AAA ACC GAG TTA TCT
	ATT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3"
SEQ ID NO. 26:	
YPL235w-S1	5' CAA GTT ACT TTG AAA GGA AAT AAA AAA AAT TGT CAG
	CAT GCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3"
SEQ ID NO. 27:	
YPL235w-S2	5' ATA TTT GAT GCA ATT TCT GCC TTA AAG TAC AAA ATG
	CTT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3"
SEQ ID NO. 28:	5' AAT ATT CAT AAA ACA GGA TCT TTC AAG GGA CGA TAA
YNL182c-\$1	AAT GCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
	AAT GCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 5
SEQ ID NO. 29:	5' TTC CTA TTT TAT TGT ACA AAA TGC GCG ACT ATT CCG
YNL182c-S2	TTT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3'
070 10 110 00	THE AGE ATA GGC CAC TAG TOGATO TOG
SEQ ID.NO. 30:	5' TCA ATC GAA GCA TTT GAA GCA TAC TCT AGA CCA AAG
YOR206w-S1	AAG ACA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
	AAG ACA GCT GAA GCT TCG TAC CCC
SEQ ID NO. 31:	5' TTG AAT TCA AGA CAA AAA ATC AAA TCT TGC TGA GTT
YOR206w-S2	GTT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3'
	GIT AGC ATA GGC CAC TAG TGG ATO TO
SEQ ID NO. 32:	5' GAA GCC TGG CTA TAC CAA TCC GGC TTT AAA AGC CCT
YJL054w-S1	TGG TCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
	IGG TON GOT GAM GOT TOO TAO GOO

SEQ ID NO. 33:	"
YJL054w-S2	5' CTT TAC CCT GTT TGA CCC AGT TCT GTG GCC AAT CTT
	TTT CGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3"
SEQ ID NO. 34:	
YJL039c-S1	5' TTC CTA AAA GTA ATT CTT AAA AGT GAT AAT GAA TGA
	CTT ACA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
SEQ ID NO. 35:	, and the second se
YJL039c-S2	5' ACC TAG TTG AAA AGA TTT GTT CCG CAG ATA AGA AAA
	AAT GGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3'
SEQ ID NO. 36:	
YOR119c-S1	5' CAC AGG GCC GCA TTA TTT CTT TGA TTT CGT TTT TTT
	CAC CCA GCT GAA GCT TCG TAC GC 3'
SEQ ID NO. 37:	
YOR119c-S2	5' GAT TTA GAG ATT CAA ACT CCG TTA TTT TTA GAA GGT
	CAT GGC ATA GGC CAC TAG TGG ATC TG 3"

SEQUENZPROTOKOLL

- (1) ALLGEMEINE INFORMATION:
 - (i) ANMELDER:
 - (A) NAME: Hoechst Aktiengesellschaft
 - (B) STRASSE: -
 - (C) ORT: Frankfurt
 - (D) BUNDESLAND: -
 - (E) LAND: Deutschland
 - (F) POSTLEITZAHL: 65926
 - (G) TELEPHON: 069-305-7072
 - (H) TELEFAX: 069-35-7175
 - (I) TELEX: -
 - (ii) ANMELDETITEL: Verfahren zum Screening von antimykotisch wirkenden Substanzen
 - (iii) ANZAHL DER SEQUENZEN: 37
 - (iv) COMPUTER-LESBARE FORM:
 - (A) DATENTRÄGER: Floppy disk
 - (B) COMPUTER: IBM PC compatible
 - (C) BETRIEBSSYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
 - (D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1.25 (EPA)
- (2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 1:
 - (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 50 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
 - (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..50
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NC: 1:

GAGAGAGA GAGAGAGAA ACTAGXXXXX XTTTTTTTT TTTTTTTTT

50

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 2:

PCT/EP98/01904 WO 98/44135

	41	
(i) ⁵	SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 13 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) i	ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix)	MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 113	
(xi)	SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 2:	
XXXXXGGCA	C GAG	13
(2) INFOR	MATION ZU SEQ ID NO: 3:	
(i)	SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 24 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
(ii)	ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix)	MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 124	
(xi)	SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 3:	
GCGGCCGC	AA GGCCTCCATG GCCG	24

(2) INFORMÀTION ZU SEQ ID NO: 4:

(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:

- (A) LÄNGE: 32 Basenpaare
- (B) ART: Nukleinsäure
- (C) STRANGFORM: Einzel
- (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)

WO	NO.	AA	125	

32

37

42

		т е	
	(ix)	MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 132	
	(xi)	SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 4:	
GATC	CGGC	CA TGGAGGCCTT GCGGCCGCTG CA	
(2)	INFO	RMATION ZU SEQ ID NO: 5:	
		SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 37 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(11)	ARI DES MODEROLS. DAS (GONOMICON)	
	(ix)	MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 137	
	(xi)) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 5:	
ATC	TGCAC	GCG GCCGCGTTTT AAGAGCTTGG TGAGCGC	
(2)	INF	ORMATION ZU SEQ ID NO: 6:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 41 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	

- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..41
- (xi) SEQUENZBESCHRZIBUNG: SEQ ID NO: 6:
 ATGGATCCGG CCATGGAGGC CTCGTTCAGA ATGACACGTA T

41

WO 98/44135

	43	
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 7:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 42 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 142	
	-	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 7:	
ATG	GGATCCGG CCATGGAGGC CTGTGGGAAT ACTCAGGTAT CG	42
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 8:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 40 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 140	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 8:	
	TOTAL CONCERN COCCUPATIONS NEW TRANSCRIPT	40

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 9:

(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:

(A) LÄNGE: 40 Basenpaare

ATCTGCAGCG GCCGCGTCTA CCCTATGAAC ATATTCCATT

(B) ART: Nukleinsäure

(C) STRANGFORM: Einzel

(D) TOPOLOGIE: linear

(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)

44

(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 140	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 9:	
ATCTGCAGCG GCCGCAAACA TGAGAATTGG GTAATAACTG	40
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 10:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
(A) LÄNGE: 47 Basenpaare	
(B) ART: Nukleinsäure	
(C) STRANGFORM: Einzel	
(D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE:	
(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 147	
(B) LAGE: 14/	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 10:	
ATGGATCCGG CCATGGAGGC CTTCAAGAAT TAGCTTTTCA ATTCATC	47
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 11:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
(A) LÄNGE: 34 Basenpaare	
(B) ART: Nukleinsäure	
(C) STRANGFORM: Einzel	
(D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	

(ix) MERKMALE:

- (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
- (B) LAGE: 1..34
- (xi) SEQUENZBESCHREIEUNG: SEQ ID NO: 11:

ATCTGCAGCG GCCGCATTTA ATAGAACAGC ATCG

45

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 12:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
(A) LÄNGE: 38 Basenpaare	
(B) ART: Nukleinsäure	
(C) STRANGFORM: Einzel	
(D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE:	
(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
(B) LAGE: 138	
(8) 1101. 11.30	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 12:	
ATGGATCCGG CCATGGAGGC CACACCGCAT AGATCGGC	38
Aldaniced Centagnace Chemosom Homosos	
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 13:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
(A) LÄNGE: 19 Basenpaare	
(B) ART: Nukleinsäure	
(C) STRANGFORM: Einzel	
(D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE:	
(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
(B) LAGE: 119	
(b) Lave: 1	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 13:	
·	
AGGCAGACTA CAACTTAGG	1

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 14:

(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:

(A) LÄNGE: 25 Basenpaare

(B) ART: Nukleinsäure

(C) STRANGFORM: Einzel

(D) TOPOLOGIE: linear

WO 98/44135

- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..25
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 14:

CTGAATTCGA TGAGGAGAAG CTAGT

25

- (2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 15:
 - (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 23 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
 - (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..23
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 15:

CTTCAAACGC TTGTTAAATC TTG

23

- (2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 16:
 - (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 25 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
 - (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
 - (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..25
 - (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 16:

47

25

CAGGATCCGT AGACCATTTT CAGAA

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 17:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 2973 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..2973

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 17:

ATTGTAAGCG TTAATATTTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT 60 120 TTTAACCAAT AGGCCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GACCGAGATA GGGTTGAGTG TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC 180 GTCAAAGGGC GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCTAA 240 TCAAGTTTTT TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC 300 CGATTTAGAG CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTGGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG 360 AAAGGAGCGG GCGCTAGGGC GCTGGCAAGT GTAGCGGTCA CGCTGCGCGT AACCACCACA 420 CCCGCCGCG TTAATGCGCC GCTACAGGGC GCGTCCCATT CGCCATTCAG GCTGCGCAAC 480 TGTTGGGAAG GGCGATCGGT GCGGGCCTCT TCGCTATTAC GCCAGCTGGC GAAAGGGGGA 540 TGTGCTGCAA GGCGATTAAG TTGGGTAACG CCAGGGTTTT CCCAGTCACG ACGTTGTAAA 600 ACGACGCCA GTGAGCGCGC GTAATACGAC TCACTATAGG GCGAATTGGA GCTCCACCGC 660 GGTGGCGCTC TAGAACTAGT GGATCCGGCC ATGGAGGCCT TGCGGCCGCT GCAGGAATTC 720 GATATCAAGC TTATCGATAC CGTCGACCTC GAGGGGGGGC CCGGTACCCA GCTTTTGTTC 78D CCTTTAGTGA GGGTTAATTG CGCGCTTGGC GTAATCATGG TCATAGCTGT TTCCTGTGTG 840 AAATTGTTAT CCGCTCACAA TTCCACACAA CATACGAGCC GGAAGCATAA AGTGTAAAGC 900

TGGGGTGCC TAATGAGTGA	GCTAACTCAC	ATTAATTGCG	TTGCGCTCAC	TGCCCGCTTT	960
CCAGTCGGGA AACCTGTCGT	GCCAGCTGCA	TTAATGAATC	GGCCAACGCG	CGGGGAGAGG	1020
CGGTTTGCGT ATTGGGCGCT	CTTCCGCTTC	CTCGCTCACT	GACTCGCTGC	GCTCGGTCGT	1080
CCGCTCCGC CGAGCGGTAT	CAGCTCACTC	AAAGGCGGTA	ATACGGTTAT	CCACAGAATC	1140
AGGGGATAAC GCAGGAAAGA	ACATGTGAGC	AAAAGGCCAG	CAAAAGGCCA	GGAACCGTAA	1200
AAAGGCCGCG TTGCTGGCGT	TTTTCCATAG	GCTCCGCCCC	CCTGACGAGC	ATCACAAAAA	1260
TCGACGCTCA AGTCAGAGGT	GGCGAAACCC	GACAGGACTA	TAAAGATACC	AGGCGTTTCC	1320
CCCTGGAAGC TCCCTCGTGC	GCTCTCCTGT	TCCGACCCTG	CCGCTTACCG	GATACCTGTC	1380
CGCCTTTCTC CCTTCGGGAA	GCGTGGCGCT	TTCTCATAGC	TCACGCTGTA	GGTATCTCAG	1440
TTCGGTGTAG GTCGTTCGCT	CCAAGCTGGG	CTGTGTGCAC	GAACCCCCCG	TTCAGCCCGA	1500
CCGCTGCGCC TTATCCGGTA	ACTATCGTCT	TGAGTCCAAC	CCGGTAAGAC	ACGACTTATC	1560
GCCACTGGCA GCAGCCACTG	GTAACAGGAT	TAGCAGAGCG	AGGTATGTAG	GCGGTGCTAC	1620
AGAGTTCTTG AAGTGGTGGC	CTAACTACGG	CTACACTAGA	AGGACAGTAT	TTGGTATCTG	1680
CGCTCTGCTG AAGCCAGTTA	CCTTCGGAAA	AAGAGTTGGT	AGCTCTTGAT	CCGGCAAACA	1740
AACCACCGCT GGTAGCGGTG	GTTTTTTGT	TTGCAAGCAG	CAGATTACGC	GCAGAAAAA	1800
AGGATCTCAA GAAGATCCTT	TGATCTTTTC	TACGGGGTCT	GACGCTCAGI	GGAACGAAAA	1860
CTCACGTTAA GGGATTTTGG	TCATGAGAT	r atcaaaaagg	ATCTTCACC1	AGATCCTTTT	1920
AAATTAAAAA TGAAGTTTTA	AATCAATCT	A AAGTATATAI	GAGTAAACT	GGTCTGACAG	1980
TTACCAATGC TTAATCAGTG	AGGCACCTA	r CTCAGCGAT	C TGTCTATTT	GTTCATCCAT	2040
AGTTGCCTGA CTCCCCGTCG	; TGTAGATAA	C TACGATACGO	G GAGGGCTTA	CATCTGGCCC	2100
CAGTGCTGCA ATGATACCGC	GAGACCCAC	G CTCACCGGC	r ccagattta	r cagcaataaa	2160
CCAGCCAGCC GGAAGGGCCC	GAGCGCAGAA	G TGGTCCTGC	A ACTTTATCC	G CCTCCATCCA	2220
GICTATTAAT TGTTGCCGGC	3 AAGCTAGAG	T AAGTAGTTC	G CCAGTTAAT	A GTTTGCGCAA	. 2280
CGTTGTTGCC ATTGCTACAC	G GCATCGTGG	T GTCACCCTC	G TCCTTTGGT	A TGGCTTCATT	2340
CAGCTCCGGT TCCCAACGA	r caaggcgag	T TACATGATO	C CCCATGTTG	T GCAAAAAAGC	2400
CCTTACCTCC TTCGGTCCT	C CGATCGTTG	T CAGAAGTAA	G TTGGCCGCA	G TGTTATCACT	2460

49

CATGGTTATG	GCAGCACTGC	ATAATTCTCT	TACTGTCATG	CCATCCGTAA	GATGCTTTTC	2520
TGTGACTGGT	GAGTACTCAA	CCAAGTCATT	CTGAGAATAG	TGTATGCGGC	GACCGAGTTG	2580
CTCTTGCCCG	GCGTCAATAC	GGGATAATAC	CGCGCCACAT	AGCAGAACTT	TAAAAGTGCT	2640
CATCATTGGA	AAACGTTCTT	CGGGGCGAAA	ACTCTCAAGG	ATCTTACCGC	TGTTGAGATC	2700
CAGTTCGATG	TAACCCACTC	GTGCACCCAA	CTGATCTTCA	GCATCTTTTA	CTTTCACCAG	2760
CGTTTCTGGG	TGAGCAAAAA	CAGGAAGGCA	AAATGCCGCA	AAAAAGGGAA	TAAGGCCGAC	2820
ACGGAAATGT	TGAATACTCA	TACTCTTCCT	TTTTCAATAT	TATTGAAGCA	TTTATCAGGG	2880
TTATTGTCTC	ATGAGCGGAT	ACATATTTGA	ATGTATTTAG	AAAAATAAAC	AAATAGGGGT	2940
TCCGCGCACA	TTTCCCCGAA	AAGTGCCACC	TAA			2973

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 18:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 4088 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..4088
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 18:

ATTGTAAGCG TTAATATTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT 60

TTTAACCAAT AGGCCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GACCGAGATA 120

GGGTTGAGTG TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC 180

GTCAAAGGGC GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCTAA 240

TCAAGTTTTT TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC 300

CGATTTAGAG CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTCGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG 360

AAAGGAGCGG GCGCTAGGGC GCTGGCAAGT GTAGCGGTCA CGCTGCGCGT AACCACCACA 420

PCT/EP98/01904

CCGCCGCGC TTAATGCGCC GCTACAGGGC GCGTCCCATT CGCCATTCAG GCTGCGCAAC	480
TGTTGGGAAG GGCGATCGGT GCGGGCCTCT TCGCTATTAC GCCAGCTGGC GAAAGGGGGA	540
TGTGCTGCAA GGCGATTAAG TTGGGTAACG CCAGGGTTTT CCCAGTCACG ACGTTGTAAA	600
ACGACGCCA GTGAGCGCGC GTAATACGAC TCACTATAGG GCGAATTGGA GCTCCACCGC	660
GGTGGCGCTC TAGAACTAGT GGATCCGGCC ATGGAGGCCT CGTTCAGAAT GACACGTATA	720
GAATGATGCA TTACCTTGTC ATCTTCAGTA TCATACTGTT CGTATACATA CTTACTGACA	780
TTCATAGGTA TACATATATA CACATGTATA TATATCGTAT GCTGCAGCTT TAAATAATCG	840
GTGTCACTAC ATAAGAACAC CTTTGGTGGA GGGAACATCG TTGGTACCAT TGGGCGAGGT	900
GGCTTCTCTT ATGGCAACCG CAAGAGCCTT GAACGCACTC TCACTACGGT GATGATCATT	960
CTTGCCTCGC AGACAATCAA CGTGGAGGGT AATTCTGCTA GCCTCTGCAA AGCTTTCAAG	1020
AAAATGCGGG ATCATCTCGC AAGAGAGATC TCCTACTTTC TCCCTTTGCA AACCAAGTTC	1080
GACAACTGCG TACGGCCTGT TCGAAAGATC TACCACCGCT CTGGAAAGTG CCTCATCCAA	1140
AGGCGCAAAT CCTGATCCAA ACCTTTTTAC TCCACGCGCC AGTAGGGCCT CTTTAAAAGC	1200
TTGACCGAGA GCAATCCCGC AGTCTTCAGT GGTGTGATGG TCGTCTATGT GTAAGTCACC	1260
ANTGCACTCA ACGATTAGCG ACCAGCCGGA ATGCTTGGCC AGAGCATGTA TCATATGGTC	1320
CAGAAACCCT ATACCTGTGT GGACGTTAAT CACTTGCGAT TGTGTGGCCT GTTCTGCTAC	1380
TGCTTCTGCC TCTTTTCTG GGAAGATCGA GTGCTCTATC GCTAGGGGAC CACCCTTTAA	1440
AGAGATCGCA ATCTGAATCT TGGTTTCATT TGTAATACGC TTTACTAGGG CTTTCTGCTC	1500
TGTCATCTTT GCCTTCGTTT ATCTTGCCTG CTCATTTTTT AGTATATTCT TCGAAGAAAT	1560
CACATTACTT TATATAATGT ATAATTCATT ATGIGATAAT GCCAATCGCT AAGAAAAAAA	1620
AAGAGTCATC CGCTAGGGGA AAAAAAAAAA TGAAAATCAT TACCGAGGCA TAAAAAAAATA	1680
TAGAGTGTAC TAGAGGAGGC CAAGAGTAAT AGAAAAAAGAA AATTGCGGGA AAGGACTGTG	1740
TTATGACTTC CCTGACTAAT GCCGTGTTCA AACGATACCT GGCAGTGACT CCTAGCGCTC	1800
ACCAAGCTCT TAAAACGCGG CCGCTGCAGG AATTCGATAT CAAGCTTATC GATACCGTCG	1860
ACCTCGAGGG GGGGCCCGGT ACCCAGCTTT TGTTCCCTTT AGTGAGGGTT AATTGCGCGC	1920
TTGGCGTAAT CATGGTCATA GCTGITTCCT GTGTGAAATT GTTATCCGCT CACAATTCCA	198

CACAACATAC GAGCCGGAAG CATAAAGTGT AAAGCCTGGG GTGCCTAATG AGTGAGCTAA 2040 CTCACATTAA TTGCGTTGCG CTCACTGCCC GCTTTCCAGT CGGGAAACCT GTCGTGCCAG CTGCATTAAT GAATCGGCCA ACGCGCGGGG AGAGGCGGTT TGCGTATTGG GCGCTCTTCC 2160 GCTTCCTCGC TCACTGACTC GCTGCGCTCG GTCGTTCGGC TGCGGCGAGC GGTATCAGCT 2220 CACTCAAAGG CGGTAATACG GTTATCCACA GAATCAGGGG ATAACGCAGG AAAGAACATG TGAGCAAAAG GCCAGCAAAA GGCCAGGAAC CGTAAAAAGG CCGCGTTGCT GGCGTTTTTC 2340 CATAGGETEE GECECETGA CGAGCATEAC AAAAATEGAE GETEAAGTEA GAGGTGGEGA 2400 AACCCGACAG GACTATAAAG ATACCAGGCG TTTCCCCCTG GAAGCTCCCT CGTGCGCTCT 2460 CCTGTTCCGA CCCTGCCGCT TACCGGATAC CTGTCCGCCT TTCTCCCTTC GGGAAGCGTG 2520 GCGCTTTCTC ATAGCTCACG CTGTAGGTAT CTCAGTTCGG TGTAGGTCGT TCGCTCCAAG 2580 CTGGGCTGTG TGCACGAACC CCCCGTTCAG CCCGACCGCT GCGCCTTATC CGGTAACTAT 2640 CGTCTTGAGT CCAACCCGGT AAGACACGAC TTATCGCCAC TGGCAGCAGC CACTGGTAAC 2700 AGGATTAGCA GAGCGAGGTA TGTAGGCGGT GCTACAGAGT TCTTGAAGTG GTGGCCTAAC 2760 TACGGCTACA CTAGAAGGAC AGTATTTGGT ATCTGCGCTC TGCTGAAGCC AGTTACCTTC 2820 GGAAAAAGAG TTGGTAGCTC TTGATCCGGC AAACAAACCA CCGCTGGTAG CGGTGGTTTT 2880 TTTGTTTGCA AGCAGCAGAT TACGCGCAGA AAAAAAGGAT CTCAAGAAGA TCCTTTGATC 2940 TTTTCTACGG GGTCTGACGC TCAGTGGAAC GAAAACTCAC GTTAAGGGAT TTTGGTCATG 3000 AGATTATCAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTAAATT AAAAATGAAG TTTTAAATCA 3060 ATCTAAAGTA TATATGAGTA AACTTGGTCT GACAGTTACC AATGCTTAAT CAGTGAGGCA 3120 CCTATCTCAG CGATCTGTCT ATTTCGTTCA TCCATAGTTG CCTGACTCCC CGTCGTGTAG 3180 ATAACTACGA TACGGGAGGG CTTACCATCT GGCCCCAGTG CTGCAATGAT ACCGCGAGAC 3240 CCACGCTCAC CGGCTCCAGA TTTATCAGCA ATAAACCAGC CAGCCGGAAG GGCCGAGCGC 3300 AGAAGTGGTC CTGCAACTTT ATCCGCCTCC ATCCAGTCTA TTAATTGTTG CCGGGAAGCT . . 3360 AGAGTAAGTA GTTCGCCAGT TAATAGTTTG CGCAACGTTG TTGCCATTGC TACAGGCATC 3420 GTGGTGTCAC GCTCGTCGTT TGGTATGGCT TCATTCAGCT CCGGTTCCCA ACGATCAAGG 3480 CGAGTTACAT GATCCCCCAT GTTGTGCAAA AAAGCGGTTA GCTCCTTCGG TCCTCCGATC 3540

52

	*					
GTTGTCAGAA	GTAAGTTGGC	CGCAGTGTTA	TCACTCATGG	TTATGGCAGC	ACTGCATAAT	3600
TCTCTTACTG	TCATGCCATC	CGTAAGATGC	TTTTCTGTGA	CTGGTGAGTA	CTCAACCAAG	3660
TCATTCTGAG	AATAGTGTAT	GCGGCGACCG	AGTTGCTCTT	GCCCGGCGTC	AATACGGGAT	3720
AATACCGCGC	CACATAGCAG	AACTTTAAAA	GTGCTCATCA	TTGGAAAACG	TTCTTCGGGG	3780
CGAAAACTCT	CAAGGATCTT	ACCGCTGTTG	AGATCCAGTT	CGATGTAACC	CACTCGTGCA	3840
CCCAACTGAT	CTTCAGCATC	TTTTACTTTC	ACCAGCGTTT	CTGGGTGAGC	AAAAACAGGA	3900
AGGCAAAATG	CCGCAAAAA	GGGAATAAGG	GCGACACGGA	AATGTTGAAT	ACTCATACTC	3960
TTCCTTTTTC	AATATTATTG	AAGCATTTAT	CAGGGTTATT	GTCTCATGAG	CGGATACATA	4020
TTTGAATGTA	TTTAGAAAAA	TAAACAAATA	GGGGTTCCGC	GCACATTTCC	CCGAAAAGTG	4080
CCACCTAA						4088

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 19:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 4583 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:
 - (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
 - (B) LAGE: 1..4583
- (xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 19:

ATTGTAAGCG TTAATATTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT 60

TTTAACCAAT AGGCCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GACCGAGATA 120

GGGTTGAGTG TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC 180

GTCAAAGGGC GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCTAA 240

TCAAGTTTTT TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC 300

CGATTTAGAG CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTGGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG 360

53

LA.	AGGAGCGG	GCGCTAGGGC	GCTGGCAAGT	GTAGCGGTCA	CGCTGCGCGT	AACCACCACA	420
C	ceccecec	TTAATGCGCC	GCTACAGGGC	GCGTCCCATT	CGCCATTCAG	GCTGCGCAAC	480
'G	TTGGGAAG	GGCGATCGGT	GCGGGCCTCT	TCGCTATTAC	GCCAGCTGGC	GAAAGGGGGA	540
'G	TGCTGCAA	GGCGATTAAG	TTGGGTAACG	CCAGGGTTTT	CCCAGTCACG	ACGTTGTAAA	600
\C	GACGGCCA	GTGAGCGCGC	GTAATACGAC	TCACTATAGG	GCGAATTGGA	GCTCCACCGC	660
G'	TGGCGCTC	TAGAACTAGT	GGATCCGGCC	ATGGAGGCCT	GTGGGAATAC	TCAGGTATCG	720
CA.	AGATGCAA	GAGTTCGAAT	CTCTTAGCAA	CCATTATTTT	TTTCCTCAAC	ATAACGAGAA	780
CA	CACAGGGG	CGCTATCGCA	CAGAATCAAA	TTCGATGACT	GGAAATTTTT	TGTTAATTTC	840
AG	AGGTCGCC	TGACGCATAT	ACCTTTTCA	ACTGAAAAAT	TGGGAGAAAA	AGGAAAGGTG	900
AG	AGGCCGGA	ACCGGCTTTT	CATATAGAAT	AGAGAAGCGT	TCATGACTAA	ATGCTTGCAT	960
CA	CAATACTT	GAAGTTGACA	ATATTATTTA	AGGACCTATT	GTTTTTTCCA	ATAGGTGGTT	1020
AG	CAATCGTC	TTACTTTCTA	ACTTTTCTTA	CCTTTTACAT	TTCAGCAATA	TATATATATA	1080
ГT	TCAAGGAT	ATACCATTCT	AATGTCTGCC	CCTATGTCTG	CCCCTAAGAA	GATCGTCGTT	1140
тт	GCCAGGTG	ACCACGTTGG	TCAAGAAATC	ACAGCCGAAG	CCATTAAGGT	TCTTAAAGCT	1200
AI	TTCTGATG	TTCGTTCCAA	TGTCAAGTTC	GATTTCGAAA	ATCATTTAAT	TGGTGGTGCT	1260
GC	TATCGATG	CTACAGGTGT	CCCACTTCCA	GATGAGGCGC	TGGAAGCCTC	CAAGAAGGTT	1320
GA	TGCCGTTT	TGTTAGGTGC	TGTGGGTGGT	CCTAAATGGG	GTACAGGTAG	TGTTAGACCT	1380
GP	\ACAAGGTT	TACTAAAAAT	CCGTAAAGAA	CTTCAATTGT	ACGCCAACTT	AAGACCATGT	1440
A.	ACTTTGCAT	CCGACTCTCT	TTTAGACTTA	TCTCCAATCA	AGCCACAATT	TGCTAAAGGT	1500
AC	CTGACTTCG	TTGTTGTCAG	AGAATTAGTG	GGAGGTATTT	ACTTTGGTAA	GAGAAAGGAA	1560
G2	ACGATGGTG	ATGGTGTCGC	TTGGGATAGT	GAACAATACA	CCGTTCCAGA	AGTGCAAAGA	1620
A'	ICACAAGAA	TGGCCGCTTT	CATGGCCCTA	CAACATGAGC	CACCATTGCC	TATTTGGTCC	1680
17	IGGATAAAG	CTAATGTTTI	GGCCTCTTC	AGATTATGGA	GAAAAACTGT	GGAGGAAACC	- 1740
λ:	TCAAGAACG	AATTTCCTAC	ATTGAAGGTT	CAACATCAAT	TGATTGATTC	TGCCGCCATG	1800
A'	TCCTAGTTA	AGAACCCAAC	CCACCTAAA	r ggtattataa	TCACCAGCAA	CATGTTTGGT	1860
_	እጥእጥረንጥረማ	CCCATCAAC	CTCCGTTATC	CCAGGTTCCT	TGGGTTTGTT	GCCATCTGCG	1920

CCTTGGCCT	CTTTGCCAGA	CAAGAACACC	GCATTTGGTT	TGTACGAACC	ATGCCACGGT	1980
CTGCTCCAG	ATTTGCCAAA	GAATAAGGTT	GACCCTATCG	CCACTATCTT	GTCTGCTGCA	2040
ATGATGTTGA	AATTGTCATT	GAACTTGCCT	GAAGAAGGTA	AGGCCATTGA	AGATGCAGTT	2100
AAAAAGGTTT	TGGATGCAGG	TATCAGAACT	GGTGATTTAG	GTGGTTCCAA	CAGTACCACC	2160
GAAGTCGGTG	ATGCTGTCGC	CGAAGAAGTT	AAGAAAATCC	TTGCTTAAAA	AGATTCTCTT	2220
TTTTTATGAT	ATTTGTACAT	ааастттата	AATGAAATTC	ATAATAGAAA	CGACACGAAA	2280
TTACAAAATG	GAATATGTTC	ATAGGGTAGA	CGCGGCCGCT	GCAGGAATTC	GATATCAAGC	2340
TTATCGATAC	CGTCGACCTC	GAGGGGGGC	CCGGTACCCA	GCTTTTGTTC	CCTTTAGTGA	2400
GGGTTAATTG	CGCGCTTGGC	GTAATCATGG	TCATAGCTGT	TTCCTGTGTG	AAATTGTTAT	2460
CCGCTCACAA	TTCCACACAA	CATACGAGCC	GGAAGCATAA	AGTGTAAAGC	CTGGGGTGCC	2520
TAATGAGTGA	GCTAACTCAC	ATTAATTGCG	TTGCGCTCAC	TGCCCGCTTT	CCAGTCGGGA	2580
AACCTGTCGT	GCCAGCTGCA	TTAATGAATC	GGCCAACGCG	CGGGGAGAGG	CGGTTTGCGT	2640
ATTGGGCGCT	CTTCCGCTTC	CTCGCTCACT	GACTCGCTGC	GCTCGGTCGT	TCGGCTGCGG	2700
CGAGCGGTAT	CAGCTCACTC	AAAGGCGGTA	ATACGGTTAT	CCACAGAATC	AGGGGATAAC	2760
GCAGGAAAGA	ACATGTGAGC	AAAAGGCCAG	CAAAAGGCCA	GGAACCGTAA	AAAGGCCGCG	2820
TTGCTGGCGT	TTTTCCATAG	GCTCCGCCCC	: CCTGACGAGC	ATCACAAAAA	TCGACGCTCA	2880
AGTCAGAGGT	GGCGAAACCC	GACAGGACTA	TAAAGATACC	AGGCGTTTCC	CCCTGGAAGC	2940
TCCCTCGTGC	GCTCTCCTGT	TCCGACCCTC	CCGCTTACCG	GATACCTGTC	: CGCCTTTCTC	3000
CCTTCGGGAA	GCGTGGCGCT	TTCTCATAG	C TCACGCTGTA	GGTATCTCAG	TTCGGTGTAG	3060
GTCGTTCGCT	CCAAGCTGGC	CTGTGTGCA	GAACCCCCC	TTCAGCCCG	CCGCTGCGCC	3120
TTATCCGGTA	ACTATCGTC1	TGAGTCCAA	CCGGTAAGAC	CACGACTTATO	GCCACTGGCA	3180
GCAGCCACTG	GTAACAGGA	TAGCAGAGC	G AGGTATGTAC	GCGGTGCTA	C AGAGTTCTTG	3240
AAGTGGTGG	CTAACTACG	G CTACACTAG	A AGGACAGTA	r TTGGTATCT	G CGCTCTGCTG .	. 3300
AAGCCAGTT	CCTTCGGAA	A AAGAGTIGG	T AGCTCTTGA	r CCGGCAAAC	A AACCACCGCT	3360
GGTAGCGGT	GTTTTTTG	T TTGCAAGCA	G CAGATTACG	C GCAGAAAA	A AGGATCTCAA	3420
GANGATOOT	r TGATCTTT	C TACGGGGTC	T GACCUTCAG	T GGAACGAAA	A CTCACGTTAA	3480

55

GGGATTTTGG	TCATGAGATT	ATCAAAAAGG	ATCTTCACCT	AGATCCTTTT	AAATTAAAA	3540
rgaagtttta	AATCAATCTA	AAGTATATAT	GAGTAAACTT	GGTCTGACAG	TTACCAATGC	3600
TTAATCAGTG	AGGCACCTAT	CTCAGCGATC	TGTCTATTTC	GTTCATCCAT	AGTTGCCTGA	3660
CTCCCCGTCG	TGTAGATAAC	TACGATACGG	GAGGGCTTAC	CATCTGGCCC	CAGTGCTGCA	3720
ATGATACCGC	GAGACCCACG	CTCACCGGCT	CCAGATTTAT	CAGCAATAAA	CCAGCCAGCC	3780
GGAAGGGCCG	AGCGCAGAAG	TGGTCCTGCA	ACTTTATCCG	CCTCCATCCA	GTCTATTAAT	3840
TGTTGCCGGG	AAGCTAGAGT	AAGTAGTTCG	CCAGTTAATA	GTTTGCGCAA	CGTTGTTGCC	3900
ATTGCTACAG	GCATCGTGGT	GTCACGCTCG	TCGTTTGGTA	TGGCTTCATT	CAGCTCCGGT	3960
TCCCAACGAT	CAAGGCGAGT	TACATGATCC	CCCATGTTGT	GCAAAAAAGC	GGTTAGCTCC	4020
TTCGGTCCTC	CGATCGTTGT	CAGAAGTAAG	TTGGCCGCAG	TGTTATCACT	CATGGTTATG	4080
GCAGCACTGC	ATAATTCTCT	TACTGTCATG	CCATCCGTAA	GATGCTTTTC	TGTGACTGGT	4140
GAGTACTCAA	CCAAGTCATT	CTGAGAATAG	TGTATGCGGC	GACCGAGTTG	CTCTTGCCCG	4200
GCGTCAATAC	GGGATAATAC	CGCGCCACAT	AGCAGAACTT	TAAAAGTGCT	CATCATTGGA	4260
AAACGTTCTT	CGGGGCGAAA	ACTCTCAAGG	ATCTTACCGC	TGTTGAGATC	CAGTTCGATG	4320
TAACCCACTO	GTGCACCCAA	CTGATCTTCA	GCATCTTTA	CTTTCACCAG	CGTTTCTGGG	4380
TGAGCAAAA	A CAGGAAGGCA	AAATGCCGCA	AAAAAGGGAA	TAAGGGCGAC	ACGGAAATGT	4440
TGAATACTC	A TACTCTTCCT	TTTTCAATAT	TATTGAAGCA	TTTATCAGGG	TTATTGTCTC	4500
ATGAGCGGA	r acatattiga	ATGTATTTAG	AAAAATAAAC	AAATAGGGGT	TCCGCGCACA	4560
TTTCCCCA	A AGTGCCACC	: TAA				458

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 20:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 4102 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzei
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)
- (ix) MERKMALE:

56

- (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
- (B) LAGE: 1..4102

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 20:

ATTGTAAGCG TTAATATTTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT 60 TTTAACCAAT AGGCCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GACCGAGATA 120 GGGTTGAGTG TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC 180 -GTCAAAGGGC GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCTAA 240 TCAAGTTTTT TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC 300 CGATTTAGAG CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTGGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG 360 ARAGGAGCGG GCGCTAGGGC GCTGGCAAGT GTAGCGGTCA CGCTGCGCGT AACCACCACA 420 CCCGCCGCGC TTAATGCGCC GCTACAGGGC GCGTCCCATT CGCCATTCAG GCTGCGCAAC 480 TGTTGGGAAG GGCGATCGGT GCGGGCCTCT TCGCTATTAC GCCAGCTGGC GAAAGGGGGA 540 TGTGCTGCAA GGCGATTAAG TTGGGTAACG CCAGGGTTTT CCCAGTCACG ACGTTGTAAA 600 ACGACGGCCA GTGAGCGCGC GTAATACGAC TCACTATAGG GCGAATTGGA GCTCCACCGC 660 GGTGGCGCTC TAGAACTAGT GGATCCGGCC ATGGAGGCCT TCAAGAATTA GCTTTTCAAT 720 TCAATTCATC ATTTTTTTT TATTCTTTTT TTTGATTTCG GTTTCTTTGA AATTTTTTTG 780 ATTCGGTAAT CTCCGAACAG AAGGAAGAAC GAAGGAAGGA GCACAGACTT AGATTGGTAT 840 ATATACGCAT ATGTAGTGTT GAAGAAACAT GAAATTGCCC AGTATTCTTA ACCCAACTGC 900 ACAGAACAAA AACATGCAGG AAACGAAGAT AAATCATGTC GAAAGCTACA TATAAGGAAC 960 GTGCTGCTAC TCATCCTAGT CCTGTTGCTG CCAAGCTATT TAATATCATG CACGAAAAGC 1020 AAACAAACTT GTGTGCTTCA TTGGATGTTC GTACCACCAA GGAATTACTG GAGTTAGTTG 1080 AAGCATTAGG TCCCAAAATT TGTTTACTAA AAACACATGT GGATATCTTG ACTGATTTTT 1140 CCATGGAGGG CACAGTTAAC CCGCTAAAGG CATTATCCGC CAAGTACAAT TTTTTACTCT . 1200 TCGAAGACAG AAAATTTGCT GACATTGGTA ATACAGTCAA ATTGCAGTAC TCTGCGGGTG 1260 TATACAGAAT AGCAGAATGG GCAGACATTA CGAATGCACA CGGTGTGGTG GGCCCAGGTA 1320 TTGTTAGCGG TTTGAAGCAG GCGGCAGAAG AAGTAACAAA GGAACCTAGA GGCCTTTTGA 1380

TGTTAGCAGA	ATTGTCATGC	AAGGGCTCCC	TATCTACTGG	AGAATATACT	AAGGGTACTG	1440
TTGACATTGC	GAAGAGCGAC	AAAGATTTTG	TTATCGGCTT	TATTGCTCAA	AGAGACATGG	1500
GTGGAAGAGA	TGAAGGTTAC	GATTGGTTGA	TTATGACACC	CGGTGTGGGT	TTAGATGACA	1560
AGGGAGACGC	ATTGGGTCAA	CAGTATAGAA	CCGTGGATGA	TGTGGTCTCT	ACAGGATCTG	1620
ACATTATTAT	TGTTGGAAGA	GGACTATTTG	CAAAGGGAAG	GGATGCTAAG	GTAGAGGGTG	1680
AACGTTACAG	AAAAGCAGGC	TGGGAAGCAT	ATTTGAGAAG	ATGCGGCCAG	CAAAACTAAA	1740
AAACTGTATT	ATAAGTAAAT	GCATGTATAC	TAAACTCACA	AATTAGAGCT	TCAATTTAAT	1800
TATATCAGTT	ATTACCCAAT	TCTCATGTTT	GCGGCCGCTG	CAGGAATTCG	ATATCAAGCT	1860
TATCGATACC	GTCGACCTCG	AGGGGGGCC	CGGTACCCAG	CTTTTGTTCC	CTTTAGTGAG	1920
GGTTAATTGC	GCGCTTGGCG	TAATCATGGT	CATAGCTGTT	TCCTGTGTGA	AATTGTTATC	1980
CGCTCACAAT	TCCACACAAC	ATACGAGCCG	GAAGCATAAA	GTGTAAAGCC	TGGGGTGCCT	2040
AATGAGTGAG	CTAACTCACA	TTAATTGCGT	TGCGCTCACT	GCCCGCTTTC	CAGTCGGGAA	2100
ACCTGTCGTG	CCAGCTGCAT	TAATGAATCG	GCCAACGCGC	GGGGAGAGGC	GGTTTGCGTA	2160
TTGGGCGCTC	TTCCGCTTCC	: TCGCTCACTG	ACTCGCTGCG	CTCGGTCGTT	CGGCTGCGGC	2220
GAGCGGTATC	: AGCTCACTCA	AAGGCGGTAA	TACGGTTATC	CACAGAATCA	GGGGATAACG	2280
CAGGAAAGAA	CATGTGAGCA	AAAGGCCAGC	: AAAAGGCCAG	GAACCGTAAA	AAGGCCGCGT	2340
TGCTGGCGTT	TTTCCATAGO	CTCCGCCCCC	CTGACGAGCA	TCACAAAAAT	CGACGCTCAA	2400
GTCAGAGGT	GCGAAACCC	ACAGGACTAT	T AAAGATACCA	GCCTTTCCC	CCTGGAAGCT	2460
CCCTCGTGC	CTCTCCTGT	r CCGACCCTG	CCCTTACCGC	ATACCTGTCC	GCCTTTCTCC	2520
CTTCGGGAA	G CGTGGCGCT	r TCTCATAGC	r cacgetgtas	GTATCTCAG	TCGGTGTAGG	2580
TCGTTCGCT	C CAAGCTGGG	C TGTGTGCAC	G NACCCCCCG	r TCAGCCCGA	CGCTGCGCCT	2640
TATCCGGTA	A CTATCGTCT	T GAGTCCAAC	C CGGTAAGAC	A CGACTTATC	G CCACTGGCAG	2700
CAGCCACTG	G TAACAGGAT	T AGCAGAGCG	A GGTATGTAG	G CGGTGCTAC	A GAGTTCTTGA	. 2760
AGTGGTGGC	C TAACTACGG	C TACACTAGA	A GGACAGTAT	T TGGTATCTG	C GCTCTGCTGA	2820
AGCCAGTTA	C CTTCGGAAA	A AGAGTTGGI	A GCTCTTGAT	C CGGCAAACA	A ACCACCGCTG	2880
GTAGCGGTG	G TTTTTTTGT	T TGCAAGCAG	C AGATTACGO	G CAGAAAAA	A GGATCTCAAG	2940

AAGATCCTTT GATCTTTTCT ACGGGGTCTG ACGCTCAGTG GAACGAAAAC TCACGTTAAG 3000 GGATTTTGGT CATGAGATTA TCAAAAAGGA TCTTCACCTA GATCCTTTTA AATTAAAAAT 3060 GAAGTTTTAA ATCAATCTAA AGTATATATG AGTAAACTTG GTCTGACAGT TACCAATGCT 3120 TAATCAGTGA GGCACCTATC TCAGCGATCT GTCTATTTCG TTCATCCATA GTTGCCTGAC 3180 TCCCCGTCGT GTAGATAACT ACGATACGGG AGGGCTTACC ATCTGGCCCC AGTGCTGCAA 3240 TGATACCGCG AGACCCACGC TCACCGGCTC CAGATTTATC AGCAATAAAC CAGCCAGCCG 3300 GAAGGGCCGA GCGCAGAAGT GGTCCTGCAA CTTTATCCGC CTCCATCCAG TCTATTAATT 3360 GTTGCCGGGA AGCTAGAGTA AGTAGTTCGC CAGTTAATAG TTTGCGCAAC GTTGTTGCCA 3420 TTGCTACAGG CATCGTGGTG TCACGCTCGT CGTTTGGTAT GGCTTCATTC AGCTCCGGTT 3480 CCCAACGATC AAGGCGAGTT ACATGATCCC CCATGTTGTG CAAAAAAAGCG GTTAGCTCCT 3540 TCGGTCCTCC GATCGTTGTC AGAAGTAAGT TGGCCGCAGT GTTATCACTC ATGGTTATGG 3600 CAGCACTGCA TAATTCTCTT ACTGTCATGC CATCCGTAAG ATGCTTTTCT GTGACTGGTG 3660 AGTACTCAAC CAAGTCATTC TGAGAATAGT GTATGCGGCG ACCGAGTTGC TCTTGCCCGG 3720 CGTCAATACG GGATAATACC GCGCCACATA GCAGAACTTT AAAAGTGCTC ATCATTGGAA 3780 AACGTTCTTC GGGGCGAAAA CTCTCAAGGA TCTTACCGCT GTTGAGATCC AGTTCGATGT 3840 ARCCCACTCG TGCACCCAAC TGATCTTCAG CATCTTTTAC TTTCACCAGC GTTTCTGGGT 3900 GAGCAAAAAC AGGAAGGCAA AATGCCGCAA AAAAGGGAAT AAGGGCGACA CGGAAATGTT 3960 GAATACTCAT ACTCTTCCTT TTTCAATATT ATTGAAGCAT TTATCAGGGT TATTGTCTCA 4020 TGAGCGGATA CATATTTGAA TGTATTTAGA AAAATAAACA AATAGGGGTT CCGCGCACAT 4080 4102 TTCCCCGAAA AGTGCCACCT AA

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 21:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 3956 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)

(ix) MERKMALE:

- (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon
- (B) LAGE: 1..3956

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 21:

ATTGTAAGCG TTAATATTTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT 60 TTTAACCAAT AGGCCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GACCGAGATA 120 GGGTTGAGTG TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC 180 240 GTCAAAGGGC GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCTAA TCAAGTTTTT TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC 300 CGATTTAGAG CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTGGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG 360 AAAGGAGCGG GCGCTAGGGC GCTGGCAAGT GTAGCGGTCA CGCTGCGCGT AACCACCACA 420 480 CCCGCCGCGC TTAATGCGCC GCTACAGGGC GCGTCCCATT CGCCATTCAG GCTGCGCAAC TGTTGGGAAG GGCGATCGGT GCGGGCCTCT TCGCTATTAC GCCAGCTGGC GAAAGGGGGA 540 TGTGCTGCAA GGCGATTAAG TTGGGTAACG CCAGGGTTTT CCCAGTCACG ACGTTGTAAA 600 ACGACGGCCA GTGAGCGCGC GTAATACGAC TCACTATAGG GCGAATTGGA GCTCCACCGC 660 GGTGGCGCTC TAGAACTAGT GGATCCGGCC ATGGAGGCCA CACCGCATAG ATCGGCAAGT 720 GCACAAACAA TACTTAAATA AATACTACTC AGTAATAACC TATTTCTTAG CATTTTTGAC 780 GARATTTGCT ATTTTGTTAG AGTCTTTTAC ACCATTTGTC TCCACACCTC CGCTTACATC 840 AACACCAATA ACGCCATTTA ATCTAAGCGC ATCACCAACA TTTTCTGGCG TCAGTCCACC 900 960 AGCTAACATA AAATGTAAGC TTTCGGGGCT CTCTTGCCTT CCAACCCAGT CAGAAATCGA GTTCCAATCC AAAAGTTCAC CTGTCCCACC TGCTTCTGAA TCAAACAAGG GAATAAACGA 1020 ATGAGGTTTC TGTGAAGCTG CACTGAGTAG TATGTTGCAG TCTTTTGGAA ATACGAGTCT 1080 1140 TTTAATAACT GGCAAACCGA GGAACTCTTG GTATTCTTGC CACGACTCAT CTCCATGCAG TTGGACGATA TCAATGCCGT AATCATTGAC CAGAGCCAAA ACATCCTCCT TAGGTTGATT 1200 ACGARACACG CCARCCARGT ATTTCGGAGT GCCTGRACTA TTTTTATATG CTTTTACARG 1260 ACTIGARATT TICCTIGCAR TRACCGGGTC RATTGTTCTC TITCTATIGG GCACACATAT 1320

AATACCCAGC	AAGTCAGCAT	CGGAATCTAG	AGCACATTCT	GCGGCCTCTG	TGCTCTGCAA	1380
GCCGCAAACT	TTCACCAATG	GACCAGAACT	ACCTGTGAAA	TTAATAACAG	ACATACTCCA	1440
AGCTGCCTTT	GTGTGCTTAA	TCACGTATAC	TCACGTGCTC	AATAGTCACC	AATGCCCTCC	1500
CTCTTGGCCC	TCTCCTTTTC	TTTTTTCGAC	CGAATTAATT	CTTAATCGGC	AAAAAAAGAA	1560
aagctccgg <i>i</i>	A TCAAGATTGT	ACGTAAGGTG	ACAAGCTATT	TTTCAATAAA	GAATATCTTC	1620
CACTACTGC	CATCTGGCGTC	ATAACTGCAA	AGTACACATA	TATTACGATG	CTGTTCTATT	1680
AAATGCGGC	GCTGCAGGAA	TTCGATATCA	AGCTTATCGA	TACCGTCGAC	CTCGAGGGG	1740
GGCCCGGTA	CCAGCTTTTG	TTCCCTTTAG	TGAGGGTTAA	TTGCGCGCTT	GGCGTAATCA	1800
TGGTCATAG	C TGTTTCCTGT	GTGAAATTGT	TATCCGCTCA	CAATTCCACA	CAACATACGA	1860
GCCGGAAGC	A TAAAGTGTAA	AGCCTGGGGT	GCCTAATGAG	TGAGCTAACT	CACATTAATT	1920
GCGTTGCGC	T CACTGCCCGC	TTTCCAGTCG	GGAAACCTGT	CGTGCCAGCT	GCATTAATGA	1980
ATCGGCCAA	C GCGCGGGAG	AGGCGGTTTG	CGTATTGGGC	GCTCTTCCGC	TTCCTCGCTC	2040
ACTGACTCG	C TGCGCTCGGT	CGTTCGGCTG	CGGCGAGCGG	TATCAGCTCA	CTCAAAGGCG	2100
GTAATACGG	T TATCCACAGA	ATCAGGGGAT	AACGCAGGAA	AGAACATGTG	AGCAAAAGGC	2160
CAGCAAAAG	G CCAGGAACCG	TAAAAAGGCC	GCGTTGCTGG	CGTTTTTCCA	TAGGCTCCGC	2220
CCCCTGAC	G AGCATCACA	AAATCGACGC	TCAAGTCAGA	GGTGGCGAAA	CCCGACAGGA	2280
CTATAAAGA	T ACCAGGCGT1	TCCCCCTGGA	AGCTCCCTCG	TGCGCTCTCC	TGTTCCGACC	2340
CTGCCGCTT	A CCGGATACC	r GTCCGCCTTT	CTCCCTTCGG	GAAGCGTGGC	GCTTTCTCAT	2400
AGCTCACGC	T GTAGGTATC	CAGTTCGGTC	TAGGTCGTTC	GCTCCAAGCT	GCGCTGTGTG	2460
CACGLACCO	C CCGTTCAGC	C CGACCGCTGC	GCCTTATCCG	GTAACTATCG	TCTTGAGTCC	2520
AACCCGGT	A GACACGACT	T ATCGCCACTO	GCAGCAGCCA	CTGGTAACAG	GATTAGCAGA	2580
GCGAGGTAT	TAGGCGGTG	C TACAGAGTT	C TTGAAGTGGT	GGCCTAACTA	CGGCTACACT	2640
AGAAGGAC	AG TATTTGGTA	T CTGCGCTCT	G CTGRAGCCAG	TTACCTTCGG	AAAAAGAGTT -	- 2700
GGTAGCTC	TT GATCCGGCA	A ACAAACAC	C GCTGGTAGCC	GTGGTTTTT	TGTTTGCAAG	2760
CAGCAGAT	TA CGCGCAGAA	A AAAAGGATC	T CAAGAAJATO	CTTTGATCT	TTCTACGGGG	2820
TCTGACGC'	rc agtggaacg	A AAACTCACG	T TANGGGATT	TGGTCATGA	ATTATCAAAA	2880

AGGATCTTCA CCTAGATCCT TTTAAATTAA AAATGAAGTT TTAAATCAAT CTAAAGTATA 2940 TATGAGTAAA CTTGGTCTGA CAGTTACCAA TGCTTAATCA GTGAGGCACC TATCTCAGCG 3000 ATCTGTCTAT TTCGTTCATC CATAGTTGCC TGACTCCCCG TCGTGTAGAT AACTACGATA 3060 CGGGAGGGCT TACCATCTGG CCCCAGTGCT GCAATGATAC CGCGAGACCC ACGCTCACCG 3120 GCTCCAGATT TATCAGCAAT AAACCAGCCA GCCGGAAGGG CCGAGCGCAG AAGTGGTCCT 3180 GCAACTTTAT CCGCCTCCAT CCAGTCTATT AATTGTTGCC GGGAAGCTAG AGTAAGTAGT 3240 TCGCCAGTTA ATAGTTTGCG CAACGTTGTT GCCATTGCTA CAGGCATCGT GGTGTCACGC 3300 TCGTCGTTTG GTATGGCTTC ATTCAGCTCC GGTTCCCAAC GATCAAGGCG AGTTACATGA 3360 TCCCCCATGT TGTGCAAAAA AGCGGTTAGC TCCTTCGGTC CTCCGATCGT TGTCAGAAGT 3420 AAGTTGGCCG CAGTGTTATC ACTCATGGTT ATGGCAGCAC TGCATAATTC TCTTACTGTC 3480 ATGCCATCCG TAAGATGCTT TTCTGTGACT GGTGAGTACT CAACCAAGTC ATTCTGAGAA 3540 TAGTGTATGC GGCGACCGAG TTGCTCTTGC CCGGCGTCAA TACGGGATAA TACCGCGCCA 3600 CATAGCAGAA CTTTAAAAGT GCTCATCATT GGAAAACGTT CTTCGGGGCG AAAACTCTCA 3660 AGGATCTTAC CGCTGTTGAG ATCCAGTTCG ATGTAACCCA CTCGTGCACC CAACTGATCT 3720 TCAGCATCTT TTACTTTCAC CAGCGTTTCT GGGTGAGCAA AAACAGGAAG GCAAAATGCC 3780 GCAAAAAAGG GAATAAGGGC GACACGGAAA TGTTGAATAC TCATACTCTT CCTTTTTCAA 3840 TATTATTGAA GCATTTATCA GGGTTATTGT CTCATGAGCG GATACATATT TGAATGTATT 3900 TAGAAAATA AACAAATAGG GGTTCCGCGC ACATTTCCCC GAAAAGTGCC ACCTAA 3956

(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 22:

- (i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
 - (A) LÄNGE: 59 Basenpaare
 - (B) ART: Nukleinsäure
 - (C) STRANGFORM: Einzel
 - (D) TOPOLOGIE: linear
- (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)

WO 98/44135

(ix) MERKMALE:

62

	(A) NAME/SCHLUSSEL: exon	
	(B) LAGE: 159	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 22:	
ATAC	GGCGCTT CTCGTATCTA TACTCAACCC GCCCCCAATG CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 23:	
(~)		
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	and the second second second	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 162	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 23:	
AAA	ATTGGGGG CACAAATGAG GGGTAAAAAT GCAGACATTA GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG		62
(2)) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 24:	
(-,	, 	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 59 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(D) TOPOLOGIE. TIMOUL	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(11) ART DES MODERODES: DRD (GENOMIZACI)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	•
	(B) LAGE: 159	
	•	

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 24:

VO 98/44135	-	PCT/EP98/0190

^	2
n	.5

TCT?	AAATCGT TATGTTGAAA ACCTAGGCAC CAATGTGACT CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 25:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 162	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 25:	
CAG	CTTTTGC CCAATATGCT CAAAACCGAG TTATCTATTA GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG		62
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 26:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 59 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(in) MDDWATE.	
	(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 159	
	(B) Bross 122	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 26:	
CAI	AGTTACTT TGAAAGGAAA TAAAAAAAAT TGTCAGCATG CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 27:	٠
•	•	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
	(W) TWINGE: OF Describance	

(B) ART: Nukleinsäure

WO 98/44135

(ix) MERKMALE:

PCT/EP98/01904

64

(C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 162	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 27:	
TATTTGATG CAATTTCTGC CTTAAAGTAC AAAATGCTTA GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
G -	62
2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 28:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 59 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear (ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 159	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 28:	
AATATTCATA AAACAGGATC TTTCAAGGGA CGATAAAATG CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 29:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 62 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	

65

	(A) NAME/SCHLUSSEL: exon (B) LAGE: 162	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 29:	
rtc(CTATTTT ATTGTACAAA ATGCGCGACT ATTCCGTTTA GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG		62
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 30:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 59 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 159	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 30:	
TC	AATCGAAG CATTTGAAGC ATACTCTAGA CCAAAGAAGA CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2)) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 31:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA: (A) LÄNGE: 62 Basenpaare (B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel (D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE: (A) NAME/SCHLÜSSEL: exon (B) LAGE: 162	

(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 31:

TTGAATTCAA GACAAAAAAT CAAATCTTGC TGAGTTGTTA GCATAGGCCA CTAGTGGATC

60

WO 98/44135	•	PCT/EP98/01904
-------------	---	----------------

66

TG		62
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 32:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 59 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure (C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(b) Toronogra. Timear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 159	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 32:	
C 2 2	GCCTGGC TATACCAATC CGGCTTTAAA AGCCCTTGGT CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
GAA	agecigge Tataceante edgetting incomment the control of the control	
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 33:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 162	
	(-)	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 33:	
CT	TTACCCTG TTTGACCCAG TTCTGTGGCC AATCTTTTTC GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG		62
12) INFORMATION ZU SEO ID NO: 34:	

(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:
(A) LÄNGE: 59 Basenpaare

67 ·

	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 159	
	(x1) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 34:	
TTCC	CTAARAG TAATTCTTAA AAGTGATAAT GAATGACTTA CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 35:	
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
	(ix) MERKMALE:	
	(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
	(B) LAGE: 162	
	(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 35:	
ACC'	TAGTTGA AAAGATTTGT TCCGCAGATA AGAAAAAATG GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG		62
(2)	INFORMATION ZU SEQ ID NO: 36:	
\-/		
	(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
	(A) LÄNGE: 59 Basenpaare	
	(B) ART: Nukleinsäure	
	(C) STRANGFORM: Einzel	•
	(D) TOPOLOGIE: linear	
	(ii) ART DES MOLEKÜLS: ENS (genomisch)	

09/44135	•	PCT/EP98/01904
1 09/4/1 55		101,32,4

Ω	e	3
О	¢	3

(ix) MERKMALE:	
(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
(B) LAGE: 159	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 36:	
CACAGGGCCG CATTATTTCT TTGATTTCGT TTTTTTCACC CAGCTGAAGC TTCGTACGC	59
(2) INFORMATION ZU SEQ ID NO: 37:	
(i) SEQUENZ CHARAKTERISTIKA:	
(A) LÄNGE: 62 Basenpaare	
(B) ART: Nukleinsäure	
(C) STRANGFORM: Einzel	
(D) TOPOLOGIE: linear	
(ii) ART DES MOLEKÜLS: DNS (genomisch)	
(ix) MERKMALE:	
(A) NAME/SCHLÜSSEL: exon	
(B) LAGE: 162	
(xi) SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ ID NO: 37:	
GATTTAGAGA TTCAAACTCC GTTATTTTTA GAAGGTCATG GCATAGGCCA CTAGTGGATC	60
TG	62

Patentansprüche:

- Verfahren zum Auffinden von antimykotisch wirkenden Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß
 - a) eine Nukleinsäure, die die Expression eines essentiellen Proteins aus Saccharomyces cerevisiae kontrolliert und/oder die für ein essentielles Protein aus Saccharomyces cerevisiae oder einen Teil desselben kodiert oder das kodierte essentielle Protein selbst oder
 - b) eine andere Nukleinsäure, die die Expression eines zu dem unter a) genannten Proteins funktionsähnlichen Proteins aus einer anderen Mycetenspezies kontrolliert und/oder die für ein zu dem unter a) genannten Protein funktionsähnlichen Protein aus einer anderen Mycetenspezies kodiert oder das kodierte funktionsähnliche Protein selbst als Target eingesetzt wird, wobei dann entweder
 - a) der Effekt einer zu untersuchenden Substanz auf die Expression des essentiellen Proteins aus Saccharomyces cerevisiae oder die funktionelle Aktivität des kodierten essentiellen Proteins selbst oder
 - b) der Effekt einer zu untersuchenden Substanz auf die Expression des funktionsähnlichen Proteins selbst aus einer anderen Mycetenspezies oder die funktionelle Aktivität des kodierten funktionsähnlichen Proteins bestimmt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Nukleinsäure ein essentielles Gen ist.
- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 2, wobei das Gen ausgewählt wird aus der Gruppe der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, wobei die andere Nukleinsäure ein Gen aus einer anderen Mycetenspezies ist, welches zu einem der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w

å

funktionsähnlich ist.

- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Nukleinsäure der Promotor eines essentiellen Gens ist.
- 6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei der Promotor ausgewählt wird aus der Reihe der Promotoren der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das essentielle Protein durch eines der Gene ausgewählt aus YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w kodiert wird.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Protein aus einer anderen Mycetenspezies zu einem essentiellen Protein, das durch eines der Gene ausgewählt aus YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w kodiert wird, funktionsähnlich ist.
- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, wobei die andere Mycetenspezies ausgewählt wird aus den Basidiomyceten, Ascomyceten und Hyphomyceten.
- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, wobei die andere Mycetenspezies ausgewählt wird aus Hemiascomycetales (Hefen), Plectascales (Schimmelpilze), Gymnascales (Haut- und Haarpilze), Conidiosporales (Hautpilze), Thallosporales (Sproßpilze), Mucor, Rhizopus, Coccidioides, Paracoccidioides (brasiliensis) (Blasomyces brasiliensis), Endomyces

(Blastomyces), Aspergillus, Penicillium (Scopulariopsis), Trichophyton (Ctenomyces), Epidermophyton, Microsporon, Piedraia, Hormodendron, Phialophora, Sporotrichon, Cryptococcus, Candida, Geotrichum und Trichosporon.

- 11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, wobei die andere Mycetenspezies ausgewählt wird aus Candida albicans, Aspargillus fumigatus, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Blasomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliens und Sporothrix schenckii.
- 12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, wobei eine Zelle bereitgestellt wird, die ein essentielles Gen von Saccharomyces cerevisiae oder ein funktonsähnliches Gen aus einer anderen Mycetenspecies überexprimiert, diese Zelle mit einer zu untersuchenden Substanz inkubiert wird und die wachstumsinhibierende Wirkung dieser Substanz bestimmt wird.
- 13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, wobei mindestens zwei Zellen bereitgestellt werden, die ein essentielles Gen aus Saccharomyces cerevisiae oder ein funktionsähnliches Gen aus einer anderen Mycetenspezies in unterschiedlichem Maße exprimieren, diese Zellen mit einer zu untersuchenden Substanz inkubiert werden und die wachstumsinhibierende Wirkung dieser Substanz vergleichend bestimmt wird.
- 14. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Zellen Saccharomyces cerevisiae Zellen des Stammes CEN.PK2 oder Derivate desselben sind.
- 15. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Zellen haploide Saccharomyces cerevisiae Zellen sind.
- 16. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, wobei ein funktionsähnliches Gen in einer anderen Mycetenspezies dadurch identifiziert wird, daß
 - Saccharomyces cerevisiae Zellen erzeugt werden, in denen ein essentielles Gen von Saccharomyces cerevisiae unter die Kontrolle eines regulierbaren Promotors gestellt wird,
 - b) die auf diese Weise veränderten Saccharomyces cerevisiae Zellen unter Wachstumsbedingungen angezogen werden, unter denen der regulierbare

- Promotor aktiv ist,
- die verändereten Saccharomyces cerevisiäe Zellen mit cDNA, hergestellt aus der anderen Mycetenspezies und vorliegend in einem Expressionsvektor, transformiert werden,
- d) der regulierbare Promotor durch Veränderung der Kulturbedingungen abgeschaltet wird, so daß nur die Saccharomyces cerevisiae Zellen überleben, in denen die cDNA, die für ein funktionsähnliches Protein in der anderen Mycetenspezies kodiert, exprimiert wird und
- e) die cDNA, die das zu dem essentiellen Gen von Saccharomyces cerevisiae funktionsähnliche Gen in der anderen Mycetenspezies repräsentiert, gegebenenfalls isoliert und analysiert wird.
- 17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das essentielle Gen von Saccharomyces cerevisiae ausgewählt wird aus der Gruppe der Gene YGR046w, YGR048w, YGR060w, YJL074c, YJR136c, YJR141w, YBR167c, YPL252c, YPL242c, YOR119c, YPL235w, YOR110w, YNL182c, YOR206w, YJL054w, YJL039c, YNL258c, YNL245c, YNL038w, YNL251c, YNL256w, YNL260c, YIR012w, YLR086w, YLR076c, YLR100w, YIR010w, YIL003w, YBR102c, YOL010w, YKL013c, YKL018w und YLL003w.
- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 und 17, wobei die Saccharomyces cerevisiae Zellen Zellen des Stammes CEN.PK2 sind.
- 19. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 16 bis 18, wobei Saccharomyces cerevisiae Zellen erzeugt werden, in deren Genom der native Promotor des essentiellen Gens durch einen regulierbaren Promotor ersetzt wird.
- 20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei Saccharomyces cerevisiae Zellen, bei denen eines der essentiellen Gene durch ein Markergen ersetzt ist, mit einem rekombinanten Expressionsvektor, der den kodierenden Teil des essentiellen Saccharomyces cerevisiae Gens unter der Kontrolle eines regulierbaren Promotors enthält, transformiert werden
- 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 und 20, wobei die Sccharomyces cerevisiae heterozygot-diploid sind.
- 22. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 19 bis 21, wobei in den heterozygot-diploiden Saccharomyces cerevisiae Zellen ein essentielle Gen durch

- ein Gen, das für einen Auxotrophiemarker kodiert, ersetzt ist.
- 23. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 19 bis 21, wobei in den heterozygot-diploiden Saccharomyces cerevisiae Zellen ein essentielles Gen durch ein Resistenzgen ersetzt ist.
- 24. Verfahren nach Anspruch 19, wobei Saccharomyces cerevisiae Zellen erzeugt werden, bei denen der native Promoter des essentiellen Gens extrachromosomal durch einen regulierbaren Promotor ersetzt wird.
- 25. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 24, wobei die Saccharomyces cerevisiae Zellen ausgewählt werden aus Zellen der Stämme CEN.EN27, CEN.EN28, CEN.EN8, CEN.RO23, CEN.RO30, CEN.RO6, CEN.RO8, CEN.SR14, CEN.SR15, CEN.SR2, CEN.SR26, CEN.SR41, CEN.SR55, CEN.SR66, CEN.SR80, CEN.SR81, CEN.HE1, CEN.HE17, CEN.HE18, CEN.HE2, CEN.HE4, CEN.HE9, CEN.HI10, CEN.HI23, CEN.HI28, CEN.HI31, CEN.HI5, CEN.HI7, CEN.FE8, CEN.KR28, CEN.TS02, CEN.TS04 und CEN.ZI26.
- 26. Saccharomyces cerevisea Zelllen der Stämme CEN.EN27, CEN.EN28, CEN.EN8, CEN.RO23, CEN.RO30, CEN.RO6, CEN.RO8, CEN.SR14, CEN.SR15, CEN.SR2, CEN.SR26, CEN.SR41, CEN.SR55, CEN.SR66, CEN.SR80, CEN.SR81, CEN.HE1, CEN.HE17, CEN.HE18, CEN.HE2, CEN.HE4, CEN.HE9, CEN.HI10, CEN.HI23, CEN.HI28, CEN.HI31, CEN.HI5, CEN.HI7, CEN.FE8, CEN.KR28, CEN.TS02, CEN.TS04 und CEN.ZI26 nach Anspruch 25.
- 27. Verwendung von Saccharomyces cerevisiae Zellen der Stämmen nach Anspruch 25 in einem Verfahren zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen in anderen Mycetenspezies.
- 28. Verwendung von Saccharomyces cerevisiae Zellen nach einem oder mehreren der Ansprüche 26 und 27 zur Identifizierung von funktionsähnlichen Genen in Candida albicans und Aspargillus fumigatus.
- 29. Verwendung von Saccharomyces cerevisiae Zellen nach Anspruch 26 zur Identifizierung von funktionsähnlichen menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Genen.
- 30. Verwendung von Saccharomyces cerevisiae Zellen nach Anspruch 26 in einem

Verfahren zur Identifizierung von antimykotisch wirkenden Substanzen.

- 31. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei die essentiellen Gene von S. cerevisiae durch Austausch einzelner Gene im Genom von S. cerevisiae gegen Markergene mit Hilfe der Plasmide pPK5/6, pPK7/8, pPK9/10 oder pPK13/14 identifiziert werden.
- 32. Plasmid pPK5/6 gemäß SEQ ID NO. 18.
- 33. Plasmid pPK7/8 gemäß SEQ ID NO. 19.
- 34. Plasmid pPK9/10 gemäß SEQ ID NO. 20.
- 35. Plasmid pPK13/14 gemäß SEQ ID NO. 21.

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/81, 1/19, 15/00, C12Q 1/18, 1/68

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/44135

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

8. Oktober 1998 (08.10.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/01904

A3

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. April 1998 (02.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 13 572.2

2. April 1997 (02.04.97)

DF

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Brüningstrasse 50, D-65929 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HINNEN, Albert [DE/DE]; Scheidlerstrasse 17, D-07745 Jena (DE). HEGEMANN, Johannes [DE/DE]; In den Gärten 33, D-35398 Giessen (DE), MUNDER, Thomas [DE/DE]; Engelplatz 3, D-07743 Jena (DE). SCHUSTER, Tilmer [DE/DE]; Eichenweg 40, D-97440 Werneck (DE). FELDMANN, Horst [DE/DE]; Pasinger Heuweg 86, D-80999 Munchen (DE). KRAMER, Wilfried [DE/DE]; Strasse an der St. Vinzenz Kirche 10, D-37077 Göttingen (DE). ZIMMERMANN, Friedrich, Karl [DE/DE]; Goethestrasse 12, D-64372 Ober-Ramstadt (DE). ENTIAN, Karl-Dieter [DE/DE]; Oberurseler Strasse 43, D-61440 Oberursel (DE). ROSE, Matthias [DE/DE]; Theodor-Heuss-Strasse 4, D-61267 Neu-Anspach (DE).

KÖTTER, Peter [DE/DE]; Industriestrasse 3A, D-61440 Oberursel (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TI, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 17. Dezember 1998 (17.12.98)

(54) Title: METHOD FOR SCREENING ANTIMYCOTICALLY ACTIVE SUBSTANCES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM SCREENING VON ANTIMYKOTISCH WIRKENDEN SUBSTANZEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for screening antimycotically active substances, whereby essential genes from mycetes, especially of Saccaromyces cerevisae, and functionally homologous and/or sequentially homologous mycetes genes are used as targets. Said method is thus characterized in that essential genes from mycetes are used as targets.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Screening von antimykotisch wirksamen Substanzen, wobei essentielle Gene aus Myceien, insbesondere von Saccaromyces cerevisae sowie funktionshomologe und/oder sequenzhomologe Mycetengene als Targets eingesetzt werden. Verfahren zum Auffinden von antimykotisch wirkenden Substanzen, dadurch gekennzeichnet, daß essentielle Gene aus Myceten als Targets eingesetzt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

		A Manufact	RS	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
	AL	Albanien	FT.	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
	AM	Armenien	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
	AT	Osterreich		Gabun	LV	Lettand	SZ	Swasiland
	AU	Australien	GA	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
	AZ	Aserbaidschan	GB	-	MD	Republik Moldau	TG	Togo
	BA	Bosnien-Herzegowina	G.B.	Georgien	MG	Madagaskar	TJ	Tadachikistan
	BB	Barbados .	GH	Ghana	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
l	BE	Belgien	GN	Guinea	MIK		TR	Turkei
l	BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TT	Trinidad und Tobago
l	BG	Bulgarien	HU	Ungara	ML	Mali	UA	Ukraine
ĺ	BJ	Benin	IR	Irland	MN	Mongolei		-
ı	BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
l	BY	Belarus	IS	Island .	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
l	CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
ı	CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
l	CG	Kongo	KE	Kenia	NL.	Niederlande	VN	Vietnam
l	CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
١	CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	Z₩	Zimbabwe
l	CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
l	CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
l	CU	Kuba	KZ	Kasachstan	kO	Kumänien		
l		Tschechische Republik	ıc	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
ĺ	CZ		и	Liechtenstein	SD	Sudan		
Į	DR	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
l	DK	Däremark Ferland	LR	Liberia	SG	Singapur		
			3.45					

International application No.

PCT/EP 98/01904

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC⁶: C12N15/81 C12N1/19 C12N15/00 C12Q1/18 C12Q1/68 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC6: C12N C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	WO 95 11969 A (RIBOGENE INC), 04 May 1995 (04.05.95), cited in the application	1,2,5, 9-13,15,16, 19-22,24
Y	see abstract see page 8 - page 13 see page 21, line 14 - line 37 see page 32, line 1 - line 16 see page 33, line 20 - line 37 see page 34, line 26 - line 30 see page 48, line 18 - line 27 see page 65, line 25 - line 70, line 17 see claim 62	14,18,23

X	Further documents are listed in the continuation of Box C.	X See patent family annex.
• "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date	of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
	14 August 1998 (14.08.98)	03 November 1998 (03.11.98)
Nan	e and mailing address of the ISA/	Authorized officer
Facs	EUROPEAN PATENT OFFICE	Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

International application No.
PCT/EP 98/01904

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	WO 95 34678 A (AMERICAN CYANAMID CO), 21 December 1995 (21.12.95), see abstract see page 3, line 22 - line 29	1,12.13,15
X	US 5 614 377 A (BULAWA CHRISTINE E), 25 March 1997 (25.03.97), see abstract see column 5, line 20 - line 44 see examples 4,5 see claim 1	1,13,15
X	EP 0 627 491 A (AMERICAN CYANAMID CO), 7 December 1994 (07.12.94), see_abstract see claims 1,2	1,12,15
X	WO 95 06132 A (MYCO PHARM INC; UNIV GEORGIA (US)). 2 March 1995 (02.03.95), see abstract	1,2,13,15
Y	GÜLDENER U. ET AL.: "A new efficient gene disruption cassette for repeated use in budding yeast", NUCL. ACIDS. RES., Vol. 24. Nr 13. 1996, pages 2519-2524, XP002074211 cited in the application see the whole document	14,18,23 .
А	TUITE M.F.: "Antifungal drug development: the identification of new targets", TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, Vol. 10, July 1992, pages 235-239, XP002074212 see the whole document	1-31
A	VAHLENSIECK H F ET AL: "IDENTIFICATION OF THE YEAST ACC1 GENE PRODUCT (ACETYL-COA CARBOXYLASE) AS THE TARGET OF THE POLYKETIDE FUNGICIDE SORAPHEN A" CURRENT GENETICS, Vol. 25. Nr 2, 1 February 1994 (01.02.94), pages 95-100, XP000196332 see the whole document	1-31
A	DATABASE SWISS PROT Accession Nr P53230, 1 October 1996 (01.10.96), ENTIAN K.D. ET AL.: "YGR046W, hypothetical 44.2 kDa protein; from S. cerevisiae chromosome VII" XP002074214 see the whole document	3,4,6-8,17, 25-30
A	MUMBERG D. ET AL.: "Regulatable promoters of S. cerevisiae: comparison of transcriptional activity and their use for heterologous expression" NUCL. ACIDS RES., Vol. 22, Nr 25, 1994, pages 5767-5768, XP002074213 cited in the application see the whole document	12,19
Х,Р	EP 0 816 511 A (HANS KNOELL INST FUER NATURSTO) 07 January 1998 (07.01.98), see the whole document see examples 4,7,8,10	1,2,12,13

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

International application No. PCT/EP98/01904

Box I Observations where	certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report	has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: because they relate to	subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.: because they relate to an extent that no mea	parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such aningful international search can be carried out, specifically:
	endent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where	unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching	Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See ADDITIONA	AL MATTER
1. As all required add searchable claims.	ditional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all
2. As all searchable class of any additional fe	aims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment e.
3. As only some of the covers only those covers	e required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report laims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. X No required addition restricted to the investment of the inve	onal search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is vention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

The International Searching Authority has found that this international application contains several (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: (1-31) in part

Method for identifying antimycotics characterized in that

- (1) an essential gene in the S. cerevisae genome is inactivated by interruption (or by promoter exchange);
- (2) the inactivated gene [the verb is missing in the German text] by a copy of the same or by a copy of functionally similar gene (optionally to be identified) from another mycete class, whereby
- (3) the replaced gene is expressed in various quantities (under to over-expresses) e.g. on the basis of a regulatable promoter or using plasmids which lead to different copy figures in the cell.

The cited method, wherein the essential inventive YGR046w gene of S. cerevisiae in strain CEN.EN27 was interrupted.

Cited strains and the use thereof to identify the gene functionally similar to YGR048w in other mycete classes.

2. Claims: (1-13) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YGR048w and strain CEN.EN8.

3. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YGR060w and strain CEN.R023

4. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJL074c and strain CEN.R030.

5. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJR136c and strain CEN.R06.

6. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJR141w and strain CEN.R08.

7. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YBR167c and strain CEN.SR14.

8. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YPL252c and strain CEN.SR15.

9. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YPL242c and strain CEN.SR2.

10. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YOR119c and strain CEN.SR26.

11. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YPL235w and strain CEN.SR41.

12. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YOR110w and strain CEN.SR55.

13. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL182c and strain CEN.SR66.

14. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YOR206w and strain CEN.SR80.

15. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJL054w and strain CEN.SR81.

16. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJL039c and strain CEN.HE1.

17. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL258c and strain CEN.HE17.

18. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL245c and strain CEN.HE18.

19. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL038w and strain CEN.HE2.

20. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YJL074c and strain CEN.R030.

21. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL256w and strain CEN.HE9.

22. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YNL260c and strain CEN.HI10.

23. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YIR012w and strain CEN.HI23.

24. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YLR086w and strain CEN.HI28.

25. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YLR076c and strain CEN.HI31.

26. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YLR100w and strain CEN.HI5.

27. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YIR10w and strain CEN.HI7.

28. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YIL003w and strain CEN.FE8.

29. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YBR102c and strain CEN.KR28.

30. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene Y0L010w and strain CEN.TS02.

31. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YKL013c and strain CEN.TS04.

32. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YKL018w and strain CEN.ZI26.

33. Claims: (1-31) in part

Same as subject 1 but relating to Gene YLL003w and strain CEN.EN28.

34. Claims: (32) in full

Newly arising vectors pPk5/6 (seq. ID 18) from pKS(+) suitable for gene interruption in S. cervisiae.

International application No.

PCT/ EP 98/01904

35. Claims: (33) in full

Newly arising vectors pPk7/8 (seq. ID 19) from pKS(+) suitable for gene interruption in S. cervisiae.

36. Claims: (34) in full

Newly arising vectors pPk9/10 (seq. ID 20) from pKS(+) suitable for gene interruption in S. cervisiae.

37. Claims: (35) in full

Newly arising vectors pPk13/14 (seq. ID 21) from pKS(+) suitable for gene interruption in S. cervisiae.

Information on patent family members

International Application No PCT/EP 98/01904

Patent document cited in search report WO 9511969 A		Publication date		ntent familiy member(s)	Publication date
		04-05-1995	AU 686685 B AU 8088494 A EP 0725818 A JP 9504176 T US 5641627 A		12-02-1998 22-05-1995 14-08-1996 28-04-1997 24-06-1997
WO 9534678	A	21-12-1995	US AU CA EP	5561051 A 2699595 A 2194983 A 0765400 A	01-10-1996 05-01-1996 21-12-1995 02-04-1997
US 5614377	Α	25-03-1997	WO	9523235 A	31-08-1995
EP 0627491	Α	07-12-1994	US	5527687 A	18-06-1996
WO 9506132	Α	02-03-1995	NONE		
EP 0816511	Α	07-01-1998	NONE	**********	

Interr 'nnales Aktenzeichen
PCT/EP 98/01904

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 1 PK 6 C12N15/81 C12N1/19 C12N15/00 C12Q1/18 C12Q1/68 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C12N C12Q IPK 6 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr, Anspruch Nr. 1,2,5, WO 95 11969 A (RIBOGENE INC) 4.Mai 1995 Х 9-13,15, in der Anmeldung erwähnt 16, 19-22,24 siehe Zusammenfassung siehe Seite 8 - Seite 13 siehe Seite 21, Zeile 14 - Zeile 37 siehe Seite 32, Zeile 1 - Zeile 37 siehe Seite 32, Zeile 1 - Zeile 16 siehe Seite 33, Zeile 20 - Zeile 37 siehe Seite 34, Zeile 26 - Zeile 30 siehe Seite 48, Zeile 18 - Zeile 27 siehe Seite 65, Zeile 25 - Seite 70, Zeile siehe Anspruch 62 14,18,23 Υ -/--Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X entnehmen "Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch enst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beenspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Veröfindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Senutzung, eine Ausstellung oder andare Maßnahmen bezieht
'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 0 3. 11. 1998 14.August 1998 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationation Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Peteritiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Galli, I

2

Interm hales Aktenzeichen
PCT/EP 98/01904

:.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
(ategorie ^e	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betræcht komme	nden Teile Betr. Anspruch Nr.		
X	WO 95 34678 A (AMERICAN CYANAMID CO) 21.Dezember 1995 siehe Zusammenfassung siehe Seite 3, Zeile 22 – Zeile 29	1,12,13, 15		
X	US 5 614 377 A (BULAWA CHRISTINE E) 25.März 1997 siehe Zusammenfassung siehe Spalte 5, Zeile 20 - Zeile 44 siehe Beispiele 4,5 siehe Anspruch 1	1,13,15		
X	EP 0 627 491 A (AMERICAN CYANAMID CO) 7.Dezember 1994 siehe Zusammenfassung siehe Ansprüche 1,2	1,12,15		
Х	WO 95 06132 A (MYCO PHARM INC ;UNIV GEORGIA (US)) 2.März 1995 siehe Zusammenfassung	1,2,13,		
Y	GÜLDENER U. ET AL.: "A new efficient gene disruption cassette for repeated use in budding yeast" NUCL. ACIDS. RES., Bd. 24, Nr. 13, 1996, Seiten 2519-2524, XP002074211 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	14,18,23		
A	TUITE M.F.: "Antifungal drug development: the identification of new targets" TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, Bd. 10, Juli 1992, Seiten 235-239, XP002074212 siehe das ganze Dokument	1-31		
A	VAHLENSIECK H F ET AL: "IDENTIFICATION OF THE YEAST ACC1 GENE PRODUCT (ACETYL-COA CARBOXYLASE) AS THE TARGET OF THE POLYKETIDE FUNGICIDE SORAPHEN A" CURRENT GENETICS, Bd. 25, Nr. 2, 1.Februar 1994, Seiten 95-100, XP000196332 siehe das ganze Dokument	1-31		
A	DATABASE SWISS PROT Accession No. P53230, 1.0ktober 1996 ENTIAN K.D. ET AL.: "YGR046W, hypothetical 44.2 kDa protein; from S. cerevisiae Chromosome VII" XP002074214 siehe das ganze Dokument	3,4,6-8, 17,25-30		
1	-/			

Interne nales Aktenzeichen
PCT/EP 98/01904

.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN ategoris* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter A	ngabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
MUMBERG D. ET AL.: "Regulatate of S. cerevisiae: comparison transcriptional activity and theterologous expression" NUCL. ACIDS RES., Bd. 22, Nr. 25, 1994, Seiten 5767-5768, XP002074213 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	ole promoters of their use for	12,19
siehe das ganze Dokument EP 0 816 511 A (HANS KNOELL II NATURSTO) 7.Januar 1998 siehe das ganze Dokument siehe Beispiele 4,7,8,10	NST FUER	1,2,12,

Int ationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/01904

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf	Blati 1
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:	
Ansprüche Nr. weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich	
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich	١,
	,
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.	
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)	
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:	
Siehe WEITERE ANGABEN	
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.	
Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.	
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dies internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.	ef
4. X Der Anmelder hat die orforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er faßt:	r-
Siehe Erfindung 1.	
Remerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch ge	zahlt.
Die Zehlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.	

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Methode zur Indentifizierung von Antimykotika, dadurch characterisiert, dass

- (1) ein essentielles Gen im S. cerevisiae-Genom durch Unterbrechung (oder durch Promoteraustausch) ausgeschaltet wird;
- (2) das ausgeschaltete Gen durch eine Kopie desselben, oder durch eine Kopie eines funktionsähnlichen (ggf. noch zu identifizierenden) Gen aus einer anderen Myzetenart, wobei
- (3) das ersetzte Gen in verschiedenen Mengen exprimiert wird (Unter- bis Ueberexpression), zum Beispiel anhand eines regulierbaren Promoter oder unter Verwendung von Plasmiden, die in der Zelle zu verschiedene Kopiezahlen führen.

Genannte Methode, wobei das als essentiell erfundene YGR046w Gen von S. cerevisiae im Stamm CEN.EN27 unterbrochen wurde.

Genannter Stamme und dessen Verwendung zur Identifizierung des funktionsähnlichen Gen zu YGRO46w in anderen Myzetenarten.

2. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YGR048w und Stamm CEN.EN8.

3. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YGR060w und Stamm CEN.RO23.

4. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YJL074c und Stamm CEN.R030.

5. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YJR136c und Stamm CEN.RO6.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

6. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YJR141w und Stamm CEN.RO8.

7. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YBR167c und Stamm CEN.SR14.

8. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1. aber betreffend Gen YPL252c und Stamm CEN.SR15.

9. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YPL242c und Stamm CEN.SR2.

10. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YOR119c und Stamm CEN.SR26.

11. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YPL235w und Stamm CEN.SR41.

12. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YOR110w und Stamm CEN.SR55.

13. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL182c und Stamm CEN.SR66.

14. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YOR206w und Stamm CEN.SR80.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

- 15. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YJL054w und Stamm CEN.SR81.
- 16. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YJL039c und Stamm CEN.HEl.
- 17. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL258c und Stamm CEN.HE17.
- 18. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL245c und Stamm CEN.HE18.
- 19. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL038w und Stamm CEN.HE2.
- 20. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL251c und Stamm CEN. ${\sf HE4}$.
- 21. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL256w und Stamm CEN.HE9.
- 22. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YNL260c und Stamm CEN.HII0.
- 23. Ansprüche: (1-31) teilweise
 - Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YIR012w und Stamm CEN.H123.
- 24. Ansprüche: (1-31) teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YLR086w und Stamm CEN.HI28.

25. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YLR076c und Stamm CEN.HI31.

26. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YLR100w und Stamm CEN.HI5.

27. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YIRO10w und Stamm CEN.HI7.

28. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YIL003w und Stamm CEN.FE8.

29. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1. aber betreffend Gen YBR102c und Stamm CEN.KR28.

30. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1. aber betreffend Gen YOLO10w und Stamm CEN.TS02.

31. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YKL013c und Stamm CEN.TS04.

32. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1. aber betreffend Gen YKL018w und Stamm CEN.ZI26.

33. Ansprüche: (1-31) - teilweise

Idem wie Subjekt 1, aber betreffend Gen YLL003w und Stamm CEN.EN28.

34. Ansprüche: (32) - vollständig

Zur Genunterbrechung in S. cerevisiae geeignete, aus pKS(+)-neu stammende Vektoren pPK5/6 (Seq. ID 18).

35. Ansprüche: (33) - vollständig

Zur Genunterbrechung in S. cerevisiae geeignete, aus pKS(+)-neu stammende Vektoren pPK7/8 (Seq. ID 19).

36. Ansprüche: (34) - vollständig

Zur Genunterbrechung in S. cerevisiae geeignete, aus pKS(+)-neu stammende Vektoren pPK9/10 (Seq. ID 20).

37. Ansprüche: (35) - vollständig

Zur Genunterbrechung in S. cerevisiae geeignete, aus pKS(+)-neu stammende Vektoren pPK13/14 (Seq. ID 21).

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/01904

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9511969	A	04-05-1995	AU AU EP JP US	686685 B 8088494 A 0725818 A 9504176 T 5641627 A	12-02-1998 22-05-1995 14-08-1996 28-04-1997 24-06-1997
WO 9534678	A	21-12-1995	US AU CA EP	5561051 A 2699595 A 2194983 A 0765400 A	01-10-1996 05-01-1996 21-12-1995 02-04-1997
US 5614377	A	25-03-1997	WO	9523235 A	31-08-1995
EP 0627491	Α	07-12-1994	US	5527687 A	18-06-1996
WO 9506132	Α	02-03-1995	KEIN	E	,
EP 0816511	Α	07-01-1998	KEIN	E	